

The Syngenta logo, which consists of the word "syngenta" in a lowercase, italicized, white sans-serif font, set against a solid dark blue rectangular background.

Ouragan System 4 je totalni herbicid.

Sastav:	Glifosat u obliku amonijeve soli (360 g/l).
Formulacija:	Tekući koncentrat za otopinu (SL).
Opis pripravka:	Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih i uskolistnih korova.
Način djelovanja:	OURAGAN SYSTEM 4 je neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju velikog broja korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, livadama, pašnjacima, strništima, ugaru, rasadnicima drvenastih kultura, šumarstvu, ukrasnom drveću te na nepoljoprivrednim površinama, željezničkim prugama i za desikaciju.
	OURAGAN SYSTEM 4 je neselektivni herbicid sa sistemičnim djelovanjem. Primjenjuje se u sljedećim kulturama ili za sljedeće namjene: <ul style="list-style-type: none">- u voćnjacima (jabuka, kruška i višnja) od druge godine starosti, vinogradima od četvrte godine starosti, na strništima i na nepoljoprivrednim površinama za suzbijanje:<ol style="list-style-type: none">a) jednogodišnjih korova u količini 2-3 l/ha (20-30 ml/100 m²);b) višegodišnjih korova u sljedećim količinama:<ul style="list-style-type: none">- 4 l/ha (40 ml/100 m²) za suzbijanje pirike (<i>Agropyron repens</i>), konjskog štavelja (<i>Rumex obtusifolius</i>) i maslačka (<i>Taraxacum officinale</i>);- 5 l/ha (50 ml/100 m²) za suzbijanje divljeg sirka (<i>Sorghum halepense</i>) i poljskog osjaka (<i>Cirsium arvense</i>)

- 7-8 l/ha (70-80 ml/100 m²) za suzbijanje zubače (*Cynodon dactylon*) i poljskog slaka (*Convolvulus arvensis*)

Navedene količine sredstva koriste se uz utrošak vode 150-200 l/ha. U slučaju jake zakorovljenosti količina vode povećava se na 300-400 l/ha.

- Suzbijanje korova se odvija u stadiju aktivnog rasta ili prije cvatnje korova;
- **prije sjetve kukuruza, šećerne i stočne repe** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 3 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (300 ml u 20-30 l vode na 1000 m²).

Sredstvo se treba primijeniti do dva dana prije sjetve navedenih kultura. Jednokratno tretiranje nije dovoljno za suzbijanje višegodišnjih korova;

- **za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova prije žetve žitarica (pšenica, ječam, zob, raž i pšenoraž) ili za njihovu desikaciju** u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (500 ml u 20-30 l vode na 1000 m²).

Primjenjuje se u stadiju razvoja žitarica BBCH 89 ili do 14 dana prije žetve;

- **na ugaru (površine koje su na „odmoru“)** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (500 ml u 20-30 l vode na 1000 m²). Primjenjuje se prije sjetve poljoprivrednih kultura, odnosno prije obrade tla;

- **kod obnove livada i pašnjaka** za suzbijanje pirike (*Agropyron repens*), kiselica (*Rumex* spp.), poljskog osjaka (*Cirsium arvense*) i svinjaka (*Sonchus* spp.).

Primjenjuje se u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (500 ml u 20-30 l vode na 1000 m²) u periodu od svibnja do kolovoza (kasno ljeto);

- **uz željezničke pruge (kolosjeke)** – primjenjuje se u količinama:

- a) 4-5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i nekih osjetljivih vrsta višegodišnjih korova;
- b) 5-8 l/ha za suzbijanje ostalih vrsta višegodišnjih korova, uključujući i neke tvrdokorne korove kao što su zubača (*Cynodon dactylon*), poljski slak (*Convolvulus arvensis*) ili

kupina (*Rubus* spp.)

Utrošak vode kod korova visine do 50 cm i normalne gustoće ne treba prelaziti 200-300 l/ha. Ovo sredstvo već sadrži potrebene pomoćne tvari te nije potrebno dodavati okvašivače ili amonijev sulfat;

- **u rasadnicima drvenastih kultura za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova** u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha (500 ml u 20-40 l vode na 1000 m²). Primjenjuje se u proljeće ili ljeto između redova uz upotrebu štitnika kako bi se spriječio dodir škropiva sa zelenim dijelovima kultura;

Primjena:

- **u šumarstvu u listopadnom i crnogoričnom drveću** za suzbijanje obične paprati (*Pteridium* sp.), uskolisnih i širokolisnih korova te drvenastih korova.

Primjenjuje se u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m²), u periodu od kolovoza do rujna na šumskim površinama bez drveća ili ispod starog drveća bez mladica uz izbjegavanje zanošenja škropiva na zelene dijelove stabala (lišće i neodrvenjeli izboji);

- **u šumarstvu u mladim nasadima listopadnog i crnogoričnog drveća** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m²).

Primjenjuje se u periodu od svibnja do lipnja kod visine korova od najmanje 15 cm između redova uz upotrebu štitnika, kako bi se spriječio dodir škropiva sa zelenim dijelovima kultura;

- **u šumarstvu u mlađom listopadnom i/ili crnogoričnom drveću (osim duglazije i ariša)** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m²). Primjenjuje se u periodu od listopada do studenog, u mirovanju vegetacije, nakon potpunog završetka rasta izboja tj. kada pupovi odrvene i postanu smeđi, a kada su korovi visine najmanje 15 cm. Primjenjuje se prskanjem širom;

- **u šumarstvu u mlađim nasadima listopadnog drveća** za suzbijanje divlje kupine (*Rubus* sp.) u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m²).

Primjenjuje se u periodu od prosinca do veljače, nakon završetka rasta izboja tj. kada pupovi odrvene i postanu smeđi, inače je moguća pojавa fitotoksičnosti. Primjenjuje

se prskanjem širom. Kupina se na ovaj način ne suzbije potpuno, već se dovoljno potisne njezin rast i razvoj tako da kultura može nesmetano rasti;

- u šumarstvu (**listopadno i crnogorično drveće**) i **ukrasnom drveću** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m²). Primjenjuje se u periodu od svibnja do lipnja kada su korovi visine najmanje 15 cm. Primjenjuje se između redova uz upotrebu štitnika kako bi se spriječio dodir škropiva sa zelenim dijelovima kultura;

- u šumarstvu (**listopadno i crnogorično drveće**) i **ukrasnom drveću** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m²) u periodu od listopada do prosinca, u mirovanju vegetacije, nakon potpunog završetka rasta izboja tj. kada pupovi odrvene i postanu smeđi inače je moguća pojava fitotoksičnosti, a kod visine korova od najmanje 15 cm. Primjenjuje se prskanjem širom;

- u šumarstvu u rasadnicima **listopadnog i crnogoričnog drveća** za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m²). Primjenjuje se najkasnije 21 dan prije sjetve odnosno sadnje.

Kod primjene sredstva OURAGAN SYSTEM 4 u šumarstvu, ako je na području koje treba tretirati prisutno divlje šumsko voće (maline, borovnice, bazge i dr.), tretirati se smije samo nakon branja bobica divljeg šumskog voća, odnosno do početka cvatnje.

Korovi na koje pripravak slabije djeluje: poljski slak (*Convolvulus arvensis*), mala kopriva (*Urtica urens*), podagrasti jarčevac (*Aegopodium podagraria*), crvena djatelina (*Trifolium pratense*), vrbolike (*Epilobium* spp.), ladolež (*Calystegia sepium*).

Korovi na koje je pripravak nedovoljno učinkovit: žednjaci (*Sedum* spp.), kaduljasti dubačac (*Teucrium scorodonia*), poljska preslica (*Equisetum arvense*), livadna preslica (*Equisetum pratense*).

OURAGAN SYSTEM 4 je najbolje primijeniti kada biljke koje treba suzbiti formiraju lisnu masu. Primjena može uslijediti prije ili nakon kraćeg noćnog mraza do – 3°C. Obrada tla moguća je nakon primjećivanja prvih simptoma.

Miješanje: OURAGAN SYSTEM 4 se **ne smije** miješati s dušičnim gnojivima i herbicidima u svrhu proširenja spektra djelovanja ili produljenja djelovanja. O mogućnostima miješanja sredstva OURAGAN SYSTEM 4 s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Upozorenja: Sredstvo OURAGAN SYSTEM 4 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Tretirani korovi **ne smiju** se zaoravati ili kositi najmanje 2-3 tjedna od primjene sredstva. OURAGAN SYSTEM 4 **ne smije** se koristiti u sjemenskoj proizvodnji žitarica i u pivarskom ječmu. Kod primjene sredstva u žitaricama slama se **ne smije** koristiti za proizvodnju komposta niti za malč. Nakon žetve usjeva potrebno je slamu ukloniti ili sasjeći i unijeti u tlo. Tretirano raslinje ne smije se koristiti za dobivanje sijena. Kod primjene sredstva u šumarstvu prisutno divlje šumsko voće se **ne smije** koristiti u prehrani. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca: 90 dana za kukuruz, 35 dana za jabuku, krušku, višnju i vinovu lozu, 14 dana za pšenicu, ječam, zob, raž i pšenoraž; kod primjene u stočnoj i šećernoj repi osigurana je vremenom primjene. Nije primjenjiva u ostalim kulturama/namjenama u kojima je odobrena primjena.

Podaci o registraciji: UP/I-320-20/08-01/211.

Prilog: Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.

Važno: Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje: 200 ml, 1 l, 5 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Ouragan_System4

- [PDF \(470 KB\)](#)