



Peak 75 WG je herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruзу.

Sastav:	Prosulfuron (750 g/l).
Formulacija:	Močive granule (WG).
Opis pripravka:	Selektivni herbicid translokacijskog i sistemičnog djelovanja, u obliku vodotopivih granula (WG), za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruзу za zrno i silažu.
Način djelovanja:	Djelatna tvar prosulfuron ulazi u biljku preko zelenih dijelova i preko korjenovog sustava. Nakon ulaska u biljku, provodnim sustavom se preneosi sistemično. Rast korovske biljke prestaje ubrzo nakon primjene prosulfurona, dok konačno ugibanje korova, kao i kod drugih sulfonil urea, nastupa nakon 14 – 21 dan nakon primjene.
Primjena:	S Peak 75 WG se upotrebljava nakon nicanja u kukuruзу za zrno i silažu (bez podusjeva) za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: hrapavog šćira (<i>Amaranthus retroflexus</i>), pelinolisne ambrozije (<i>Ambrosia elatior</i>), bijele lobode (<i>Chenopodium album</i>), obićnog malog čićka (<i>Xanthium strumarium</i>), europskog mraćnjaka (<i>Abutilon theophrasti</i>), velikog dvornika (<i>Polygonum persicaria</i>), slatkastog dvornika (<i>Polygonum convolvulus</i>), poljske gorušice (<i>Sinapis arvensis</i>) i drugih. Odlično djeluje i na kiselice (<i>Rumex</i> spp.) i dobro na poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>). Koristi se u kolićini od 20-30 g/ha (0,2-0,3 g/100 m²) uz dodatak okvašivaća, npr. Etalfix Pro u kolićini 300 ml/ha. Primjenjuje se folijarnim prskanjem nakon nicanja kukuruза, u stadiju 3-5 listova kukuruза i do najviše 4 lista korova.
O mogućnosti miješanja sa drugim herbicidima,	

Miješanje:	posebice onima koji djeluju putem korijena, raspitajte se kod proizvođača.
Upozorenja:	Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo se ne smije koristiti u kukuruzu s podusjevom. Peak 75 WG se ne smije koristiti u sjemenskim usjevima kukuruza. Nakon primjene sredstva PEAK 75 WG smiju se u plodoredu sijati sljedeće kulture: - nakon 2 mjeseca: kukuruz šećerac, kukuruz kokičar, pšenica, ječam, zob, raž i pšenoraž; - nakon 9 mjeseci: grah, kupus, grašak, krumpir, soja, duhan, rajčica i trave za krmu; - nakon 15 mjeseci: lucerna, crvena djetelina i leća; - nakon 24 mjeseca: bijeli luk, suncokret i šećerna repa; - nakon 18 mjeseci: svi ostali usjevi. Pazite da domaće životinje i druge životinje ne ulaze na svježe tretiranu površinu.
Karenca:	Karenca za kukuruz je osigurana vremenom primjene.
Podaci o registraciji:	Dozvola za promet MPRRR RH. Klasa br.: UP/I-320-20/08-01/97.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.
Važno:	Prije primjene obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	20g; 100 g

Sigurnosno - tehnički list

STL_Peak 75 WG

- [PDF](#) (592 KB)