



Match 050 EC je insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u raznim kulturama.

Sastav:	Lufenuron (50 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	Match 050 EC je nesistemični ovo-larvicid (djeluje na jajašca i ličinke). Pripada grupi regulatora razvoja kukaca. Prikladan za primjenu u integriranoj zaštiti bilja i tamo gdje je utvrđena rezistentnost na druge grupe insekticida.
Način djelovanja:	Djelatna tvar lufenuron inhibira tvorbu hitina. Inhibiranjem hitina ne stvara se nova koža (eksoskelet) ličinke, potrebna za presvlačenje ličinke u novi stadij pa to presvlačenje izostane. Nakon primjene insekticida Match, ličinke se prvo prestaju hraniti, a tek onda ugibaju. Lufenuron djeluje i na jajašca štetnika iz kojih ne izlaze ličinke. Pripravak ne djeluje na odrasle oblike štetnih kukaca.
Insekticid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca u zaštićenom prostoru na: a) - krumpiru za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) u količini od 0,3 l/ha (3ml/100m²). b) - paprici za suzbijanje gusjenica kukuruznog moljca (<i>Ostrinia/Pyrausta/nubilalis</i>) u količini od 2 l/ha (200 ml na 1000m²). Sredstvo primijeniti u periodu odlaganja jaja i pojave ličinki i gusjenica prvih stadija. <u>Male kulture i male namjene:</u>	

1) patlidan u zaštićenom prostoru za suzbijanje:

- tripsa (*Frankliniella* spp.), u dozi od 2 l/ha uz
utrošak 10 l vode/100 m². S primjenom započeti u
periodu odlaganja jaja. Dozvoljene su najviše dvije
primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-14
dana.

- krumpirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) u
dozi od 0,4 l/ha uz utrošak 10 l vode/100 m². S
primjenom započeti u periodu odlaganja jaja.

Dozvoljena je jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

- žute kukuruzne sovice (*Heliothes armigera*) u dozi
od 0,6 l/ha uz utrošak 10 l vode/100 m². S primjenom
započeti u periodu odlaganja jaja. Dozvoljena je jedna
primjena tijekom jedne vegetacije.

2) ukrasno bilje u zaštićenom prostoru za

suzbijanje tripsa (*Frankliniella* spp.), u dozi od 2 l/ha
uz utrošak 10 l vode/100 m². S primjenom započeti u
periodu odlaganja jaja. Dozvoljene su najviše dvije
primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-14
dana.

OGRANIČENJA:

Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje i aktivnog
leta pčela i ostalih oprašivača. Smije se primijeniti
samo jednom godišnje u vegetaciji na istoj površini ili
u istom nasadu. Aviotretiranje nije dozvoljeno. Ne
preporučuje se miješati s sredstvima na osnovi
aktivne tvari *fenoksikarb* i *ditianona* i ostalim
sredstvima koja se koriste kao bordoška suspenzija
(sredstva na osnovi bakar-hidroksid-kalcij-sulfat
kompleksa).

Miješanje:

O mogućnosti miješanja sredstva MATCH 050 EC sa
drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o
registraciji/zastupnika.

Upozorenja:

Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve (povrće i dr.).
Sredstvo primijeniti u periodu odlaganja jaja i pojave
ličinki i gusjenica prvih stadija. Ne smije se
primjenjivati u vrijeme cvatnje i aktivnog leta pčela i
ostalih oprašivača. Izbjegavati prskanje po velikim
vrućinama ili ako se očekuju padaline.

Karenca:	7 dana za krumpir u zaštićenom prostoru, 7 dana za papriku u zaštićenom prostoru.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/03-01/114.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno – tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	100 ml, 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL-Match 050 EC_NG2

- [PDF](#) (508 KB)