



Pirimor 50 WG je sistemski insekticid - aficid namijenjen suzbijanju lisnih uši u brojnim kulturama.

Sastav:	Pirimikarb (50%).
Formulacija:	Močive granule (WG).
Opis pripravka:	PIRIMOR 50 WG je selektivni insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši (porodica Aphididae). Djeluje na širok spektar vrsta lisnih ušiju poglavito na na krvavu uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>).
Način djelovanja:	Pirimikarb je insekticid iz kemijske skupine karbamata. Kod štetnika ometa tvorbu acetilkolin esterase. Djeluje želučano i kontaktno. Upija se u list te ima odlično translaminarno kretanje pa dospijeva i do štetnika u zakovrčanom lišću. Ostvaruje izvjesno djelovanje putem para. Pirimikarb pokazuje vrlo visoku selektivnost za prirodne neprijatelje štetnika i pčele pa se odlično uklapa u sve programe integrirane zaštite bilja. Selektivan je na parazitsku osicu <i>Aphelinus mali</i>, prirodnog neprijatelja krvave uši te se stoga može preporučiti upotreba pirimikarba i u vrijeme leta ove parazitske osice. Na voćkama, vinovoj lozi, povrću (osim salate, radiča, mrkve, celera i peršina u zaštićenom prostoru) i ukrasnom bilju u koncentraciji sredstva 0,04-0,06 % (40-60 g u 100 l vode). Tijekom iste vegetacije na istoj površini ili nasadu smije se primjenjivati najviše: - dva puta: na koštičavim voćkama, salati, grašku, paprici, korjenastom povrću, - tri puta: na jezgričavim voćkama, kupusnjačama, rajčici i grahu, - četiri puta: na jagodi, krastavcu, krumpiru i šećernoj repi. U duhanu i ratarskim usjevima (osim uljane repice

poslije cvatnje) u količini 400-600 g/ha (40-60 g na 1000 m²). Tijekom iste vegetacije na istoj površini ili nasadu smije se primjenjivati najviše:
- dva puta: na pšenici, lucerni, duhanu i ratarskim usjevima koji nisu posebno navedeni.

Male kulture i male namjene

1) Marelica, malina, kupina i borovnica za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u dozi od 0,04 – 0,06% (4 -6 g/10 litara vode). Dozvoljena je primjena jednom godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti na početku napada.

2) Radič na otvorenom prostoru za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u dozi od 300 g/ha uz utrošak vode od 400-600 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 10-14 dana. Sredstvo primjeniti na početku napada.

3) Kineski kupus za suzbijanje kupusne lisne uši (*Brevicoryne brassicae*) u dozi od 420 g/ha uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dozvoljena je primjena jednom godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti na početku napada.

KARENCA: Za marelice iznosi 28 dana, za malinu, kupinu i borovnicu iznosi 21 dan, za radič iznosi 3 dana i za kineski kupus iznosi 3 dana.

NAPOMENA: O mogućnostima miješanja sredstva Pirimor 50 WG s drugim sredstvima za zaštitu bilja raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

OGRANIČENJA

Spo-Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i filtarske polumaske ili maske za zaštitu od čestica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom.

Spo-Obavezno je nošenje nepropusne zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i čvrste obuće kod primjene pomoću leđne prskalice ili rasprskivača i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.

SPo5-Na tretirane površine dozvoljeno je ulaziti tek nakon što se primijenjeno sredstvo osuši. Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti zaštićene prostore

Primjena:

	(staklenike, plastenike).
Miješanje:	Sredstvo se ne smije miješati s pripravcima lužnate reakcije, bordoškom suspenzijom, fungicidima na osnovi propamokarba i fiziotropima na osnovi etefona.
Upozorenja:	Sredstvo se na uljaricama ne smije primjenjivati poslije cvatnje. Ne smije se primjenjivati na salati, radiču, mrkvi, celeru i peršinu u zaštićenom prostoru. Primjena iz zrakoplova dopuštena je samo na izrazito velikim površinama uz uvjet da se provodi na udaljenosti najmanje 500 m od naselja i gospodarskih zgrada i 300 m od voda, izvora voda i bunara uz utrošak vode od najmanje 50 l/ha.
Karenca:	- 4 dana: za krastavac (u polju i zaštićenom prostoru) i korijen šećerne repe; - 7 dana: za rajčicu (u polju i zaštićenom prostoru), korabu bez lišća i krumpir; - 14 dana: za jabuku, krušku, agrume, višnju, jagodu, grašak, grah, bob, poriluk, korjenasto povrće u polju, salatu u polju, špinat, blitvu, kupusnjače, papriku (u polju i zaštićenom prostoru), lišće korabe i lišće šećerne repe; - 21 dan: za žitarice, lucernu i duhan; - 28 dana: za breskvu, šljivu, soju i ostale ratarske usjeve; - 35 dana: za vinovu lozu.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/01-01/132.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	0,5 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Pirimor 50 WG

- [PDE](#) (494 KB)