



Amistar Opti je fungicid za suzbijanje bolesti u ratarskim kulturama s širokim spektrom djelovanja.

Sastav:	Azoksistrobin (80 g/l) i klortalonil (400 g/l).
Formulacija:	Koncentrirana suspenzija (SC).
Opis pripravka:	Amistar Opti je preventivno kurativni fungicid. Uz kontaktno ima i sistemično djelovanje. Primjenjuje se za suzbijanje širokog spektra bolesti, a poglavito pšenične lisne pjegavosti (<i>Septoria tritici</i>) te ramularijske pjegavosti ječma (<i>Ramularia collo cygni</i>).
Način djelovanja:	Djelatna tvar azoksistrobin omogućuje dugotrajnu zaštitu koja je posebno značajna u vrijeme nalijevanja zrna. Klortalonil dugo ostaje na površini lista te na taj način sprečava početak infekcije gljivičnih bolesti. Kombinacijom dviju djelatnih tvari u pripravku Amistar Opti omogućuje se izvrstan fungicidni učinak što u konačnici dovodi i do pozitivnog učinka na visinu uroda.
Primjena:	U pšenici za suzbijanje: - smeđe pjegavosti lista (<i>Septoria tritici</i>), - žuto smeđe pjegavosti lista, (<i>Pyrenophora tritici - repentis</i>), - smeđe rđe (<i>Puccinia recondita</i>). U odmjeri 2,5 l/ha (250 ml na 100 m²) pri uporabi 200 - 400 l vode na ha (2 - 4 l vode na 100 m²). Primjenu obaviti od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 26 - 61). U ječmu za suzbijanje: - ramularijske pjegavosti (<i>Ramularia collo cygni</i>), - mrežaste pjegavosti (<i>Pyrenophora teres</i>), - smeđe rđe (<i>Puccinia hordei</i>), - sive pjegavosti lista (<i>Rhynchosporium secalis</i>). U odmjeri 2,5 l/ha (250 ml na 100 m²) pri uporabi 200 -

400 l vode na ha (2 - 4 l vode na 100 m²). Primjenu obaviti od kraja busanja do početka klasanja (BBCH 29 - 51).

U pšenoraži za suzbijanje:

- pjegavosti lista (*Septoria* spp.),
- smeđe rđe (*Puccinia recondita*).

U odmjeri 2,5 l/ha (250 ml na 100 m²) pri uporabi 200 - 400 l vode na ha (2 - 4 l vode na 100 m²). Primjenu obaviti od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25 - 61).

Miješanje:

Sredstvo se može miješati s većinom fungicida i insekticida. Nije preporučljivo miješanje sa folijarnim gnojivima Nutrimix® ili Basfoliar®. Isto tako ne preporuča se miješanje s gnojivima na osnovi amonij-sulfata.

Upozorenja:

Pripravak Amistar Opti može se primjeniti u pšenici maksimalno dva puta tijekom vegetacije, a u ječmu i pšenoraži samo jednom.

Karenca:

51 dan za ječam, a za pšenicu i pšenoraž karenca je osigurana vremenom primjene.

Podaci o registraciji: UP/I-320-20/08-01/349.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list.

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

1 l, 5 l i 10 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Amistar opti

- [PDF](#) (499 KB)