



Artea Plus je kombinirani sistemski fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu i šumarstvu.

Sastav:	Ciprokonazol (160 g/l) i propikonazol (250 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	Artea Plus je sistemski fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi i šumarstvu.
Način djelovanja:	Obje djelatne tvari pripadaju triazolnoj skupini koju odlikuje sistemičnost tj. vrlo dobra provodljivost kroz biljne organe . Pripravak Artea Plus zbog preventivnog i kurativnog djelovanja može se primijeniti u uvjetima kada su već nastupile infekcije.
Primjena:	U suzbijanju bolesti na pšenici: - pepelnica (<i>Blumeria (Erysiphe) graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>), - rđe (<i>Puccinia recondita</i>), - smeđe pjegavosti lista (<i>Septoria tritici</i>) u odmjeri od 0,4 – 0,5 l/ha uz najviše dva tretiranja u vegetaciji u razmaku od najmanje 21 dan. U suzbijanju bolesti na ječmu: - pepelnice (<i>Blumeria (Erysiphe) graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>), - rđe (<i>Puccinia hordei</i>), - smanjuje zarazu sivom pjegavosti lista ječma (<i>Rhynchosporium secalis</i>), u odmjeri od 0,4 – 0,5 l/ha, uz najviše dva tretiranja u vegetaciji u razmaku od najmanje 21 dan. Na osjetljivim sortama ječma zadovoljavajuća djelotvornost sredstva postiže se samo uz dva tretiranja (prvo u fazi vlatanja, a drugo početkom cvatnje). U suzbijanju bolesti na šećernoj repi: - pjegavosti lista šećerne repe (<i>Cercospora beticola</i>), u odmjeri od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m²) uz najviše dva tretiranja u vegetaciji. U suzbijanju bolesti u šumarstvu:

	- hrastove pepelnice (<i>Microsphaera alphitoides</i>) u odmjeri od 0,4-0,5 l/ha uz najviše dva tretiranja godišnje.
Miješanje:	Pripravak se dobro miješa s većinom drugih sredstava za zaštitu bilja kao što je: Karate zeon, Amistar Extra, Axial, Lintur, Logran, i Moddus . Sredstvo se ne smije miješati s folijarnim gnojivom prije fenofaze BBCH 32 pšenice i ječma.
Upozorenja:	Ne tretirati pri visokim temperaturama, po vlažnom listu, pri brzini vjetra većoj od 5 m/s, te u uvjetima gdje se u kratkom vremenu očekuje kiša. Primjena iz zrakoplova dopuštena je u šumarstvu te na izrazito velikim površinama pod šećernom repom, uz uvjet da se tretira na udaljenosti najmanje 500 m od naselja i gospodarskih zgrada, 300 m od bunara, vodotokova, jezera i mora te 1 km od ribnjaka. Prilikom primjene iz zrakoplova brzina vjetra treba biti ispod 3 m/s, a relativna vlažnost zraka iznad 55%.
Karenca:	42 dana za pšenicu, ječam, i šećernu repu, 28 dana za šumske plodine.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/06-01/143.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	250 ml, 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Artea Plus

- [PDF](#) (658 KB)