



Fongani Gold®



Fongani Gold je fungicid za suzbijanje bolesti na voćkama, paprici, jagodi, duhanu, cvijeću, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom drveću i travnjacima.

Sastav:	Metalaksil-M (465,2 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za otopinu (SL).
Opis pripravka:	Fongani Gold je fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama, jagodi, povrću, duhanu, ukrasnom bilju crnogoričnom i bjelogoričnom drveću te travnjacima.
Način djelovanja:	Aktivna tvar metalaksil-M unosi se u biljku putem korijena te se ksilemom raspoređuje po cijeloj biljci i djeluje na uzročnike bolesti na način da zaustavlja rast micelija u tkivu. Rezidualno djelovanje je među najdužim u usporedbi sa ostalim peronosporicidima.

FONGANIL GOLD je izrazito sistemski fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Pythium i Phytophthora vrste. Učinkovito djeluje još 14 dana nakon tretiranja.

FONGANIL GOLD se upotrebljava zalijevanjem pojedinačnih biljaka, ili prskanjem supstrata ili tla prije sadnje uz inkorporaciju u tlo u području sadnje:

- **na voćkama** (jabuka, naranča, limun, mandarina, klementina i kivi), za suzbijanje truleži korijena (Phytophthora spp.) u količini 1-2 ml/m². Tretiranje izvršiti zalijevanjem područja korijena u početku vegetacije. Po potrebi ponoviti nakon 2-3 mjeseca.
- **na paprici**, za suzbijanje plamenjače (gangrene) korijenova vrata (Phytophthora capsici) prskanjem u trake širine 30-40 cm u količini od 1 l/ha prije presađivanja, uz inkorporaciju u tlo na dubinu 30-40 cm, uz primjenu vode 300-600 l/ha ili zalijevanjem u količini od 2 l/ha 20 dana nakon presađivanja uz primjenu 100-1000 l vode/ha. Po potrebi ponoviti nakon 4-6 tjedana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
- **na jagodi**, za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora

vrste, prskanjem u količini od 2 l/ha prije sadnje, uz inkorporaciju u tlo u području sadnje, uz primjenu vode 300-600 l/ha ili zalijevanjem prije početka vegetacije u količini od 0,1 ml/biljci uz primjenu 0,1 l vode po biljci. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

- **na povrtnim kulturama** (salata, cvjetača, brokula, dinja i lubenica), za suzbijanje bolesti koje uzrokuju ***Pythium spp.*** i ***Phytophthora spp.*** prskanjem u količini 0,1-0,2 ml/m² pri sjetvi ili prije presađivanja, uz inkorporaciju u tlo, uz primjenu vode 300-600 l/ha. Po potrebi ponoviti nakon 25-30 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

- **na duhanu**, za suzbijanje ***Pythium spp.*** i ***Phytophthora spp.***, prskanjem u redove u količini od 1 l/ha prije presađivanja uz inkorporaciju u tlo ili zalijevanjem nakon presađivanja.

- **cvijeće i ukrasno bilje**, za suzbijanje ***Pythium spp.*** i ***Phytophthora spp.*** zalijevanjem u količini od 25 ml sredstva na 5-10 l vode na m³ supstrata. Potrebna količina sredstva primjenjuje se na zemljani supstrat i ravnomjerno umiješa, neposredno prije sadnje. Ulončene biljke tretiraju se nakon sadnje zalijevanjem u koncentraciji 0,013% uz utrošak 50-100 ml otopine po loncu promjera 10-14 cm, odnosno 50 ml otopine po loncu promjera manjeg od 9 cm. Sredstvo po mogućnosti primijeniti na vlažnu zemlju. Nakon tretiranja zalijevanjem potrebno je odmah doliti zemlji vodu, kako bi aktivna tvar dospjela u zonu korijena i kako bi se eventualno isprali ostaci otopine na listovima. Po potrebi ponoviti postupak nakon 30-40 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

- **na crnogoričnom i bjelogoričnom drveću**, za suzbijanje bolesti koje uzrokuju vrste iz roda ***Phytophthora***, zalijevanjem u količini 1-2,6 ml/biljci prije sadnje te 2,6-8 ml/biljci nakon sadnje u rasadniku, ili 1-2 ml/biljci na početku vegetativnog razvoja. Po potrebi ponoviti nakon 3-6 mjeseci. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

- **na travnjacima**, za suzbijanje bolesti koje uzrokuju ***Pythium*** vrste, u količini 0,75-1,5 l/ha. Kod tek zasijanih travnjaka dopuštene su najviše 3 aplikacije u razmaku od 7-14 dana. Tretiranje je potrebno izvršiti odmah nakon sjetve, te nakon toga zaliti. Kod etabliranih travnjaka, sredstvo primijeniti u periodu povoljnom za razvoj bolesti, u razmaku 10-21 dan uz najviše 3 aplikacije u jednoj sezoni. Preporučena količina vode na travnjacima je 200-400 l/ha.

Primjena:

Male kulture i male namjene:

1) **Mrkva**, za suzbijanje bolesti *Pythium spp.* u dozi 0,5 l/ha. Dozvoljeno je sredstvo koristiti dva puta tijekom jedne vegetacije. Prvu primjenu potrebno je napraviti neposredno prije pojave prvog pravog lista, a drugu primjenu nakon tri tjedna. Vrijeme primjene je tijekom travanja, svibanja, lipanja odnosno listopada i studenog mjeseca.

2) **Mrkva**, za suzbijanje bolesti *Phytophthora spp.* u dozi 0,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prskanjem širom ili tretiranjem tla. Dozvoljeno je sredstvo koristiti dva puta tijekom jedne vegetacije. Prvu primjenu potrebno je napraviti za vrijeme sjetve, a drugu primjena je između pojave prvog i trećeg lista. Vrijeme primjene je tijekom travanja, svibanja, lipanja odnosno listopada i studenog mjeseca.

NAPOMENA: Da bi se izbjegla pojava rezistentnosti što se očituje smanjenom djelotvornošću treba se strogo pridržavati uputa za primjenu na etiketi ili/i popratnom listu.

OGRANIČENJA: Sigurnosni razmak od površine vode prilikom primjene sredstva je 1 m.

MJERE ZAŠTITE PRI RADU

SPo - Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica, zaštitne odjeće i štitnika za oči/lice kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom.

SPo - Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i zaštitne odjeće kod primjene primjene i rukovanja s razrijeđenim sredstvom i škropivom.

SPo - Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i zaštitne odjeće u dodiru s površinama koje su onečišćene s nerazrijeđenim sredstvom ili škropivom.

SPo 2 – Nakon upotrebe sredstva oprati zaštitnu odjeću.

KARENCA: 42 dana za mrkvu.

Miješanje:	Nije predviđeno miješanje s drugim sredstvima.
------------	--

Upozorenja:	Plodored: Nakon primjene sredstva, mogu se sve kulture naknadno saditi u plodoredu (čak i kod prijevremenog preoravanja). Ne smije se koristiti u blizini rasadnika vinove loze. Ovo sredstvo sadrži aktivnu tvar koja je štetna za ptice.
-------------	--

Karenca:	Karenca: 180 dana za kivi; 40 dana za jagodu; 30 dana za naranča, limun, mandarina i klementina; 28 dana za jabuka i duhan; 20 dana za dinju, cvjetaču i brokulu; 15 dana za papriku i salatu; 5 dana za lubenicu;
----------	--

Podaci o	Rješenje o registraciji SZB za promet MPRRR RH Klasa br.:
----------	---

registraciji:	UP/I-320-20/08-01/27.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	1 l.

Sigurnosno-tehnički list

Fonganil Gold

STL_Fonganil Gold

- [PDF](#) (487 KB)