



Revus je novi fungicid sa izraženim djelovanjem na plamenjače krumpira, rajčice i krastavaca.

Sastav:	Mandipropamid (250g/l).
Formulacija:	Koncentrirana suspenzija (SC).
Opis pripravka:	Revus je novi fungicid sa iznimnim djelovanjem na plamenjače (<i>Phytophthora</i> , <i>Plasmopara</i> , <i>Peronospora</i>). Odlično se veže na biljnu površinu te postupno ulazi u list što mu omogućava visoku otpornost na ispiranje oborinama i sigurnost u djelovanju.
Način djelovanja:	Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz njih postupno premješta i ulazi u biljne organe premještajući se i do suprotne, netretirane strane lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje. Mandipropamid snažno djeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije. Na gljivice djeluje negativno putem ometanja biosinteze fosfolipida.
	U krumpiru za suzbijanje krumirove plijesni (<i>Phytophthora infestans</i>), u odmjeri od 400-600 ml/ha u razmacima od 7-10 dana. Može se koristiti najviše tri puta u istoj vegetaciji. Za proširenje spektra na crnu koncentričnu pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), Revus se može miješati s pripravcima Quadris 250 SC, Daconil 720 SC. U rajčici za suzbijanje plamenjače rajčice (<i>Phytophthora infestans</i>) u količini od 400-600 ml/ha u razmacima od 7-10 dana. Može se najviše tri puta koristiti u istoj vegetaciji. Za proširenje spektra na

Primjena:	lisne pjegavosti (<i>Alternaria</i> i sl.), Revus se može miješati sa pripravcima Quadris 250 SC ili Daconil 720 SC U krastavcima za suzbijanje plamenjače krastavaca (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) u odmjeri od 400-600 ml/ha u razmacima od 7-10 dana. Može se koristiti najviše tri puta u istoj vegetaciji. Preporučuje se preventivna primjena pripravka. Niže doze mogu se koristiti u uvjetima slabijeg pritiska bolesti.
Miješanje:	Sredstvo se može miješati s većinom drugih sredstava za zaštitu bilja u navedenim kulturama.
Upozorenja:	U krastavcima se radi antirezistentne strategije preporučuje primjena pripravka Revus u programu prskanja sa fungicidima iz drugih skupina. Preporučuje se primijeniti Revus u blok tretiranju sa 2 – 3 aplikacije, a zatim je potrebno promijeniti način djelovanja tj. koristiti fungicid iz neke druge skupine (Revus je prema FRAC-u svrstan u skupinu 40 CAA). Također se kao dio antirezistentne strategije može smatrati dodavanje fungicida iz druge skupine, najbolje iz grupe tzv. "multi site" pripravaka. U krumpiru i rajčici, gdje rezistencija na dotičnu grupu fungicida još nije detektirana, nema potrebe za posebnim mjerama antirezistentne strategije.
Karenca:	3 dana za rajčicu, krastavce i krumpir.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/06-01/281.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	100 ml, 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Revus

- [PDE](#) (570 KB)