



Ridomil Gold[®]

Plus



Ridomil Gold Plus 42,5 WP je kombinacija metalaksila-M i bakra.

Sastav:	Metalaksil-M (24 g/l) + bakar u obliku bakrenog oksiklorida (400 g/l).
Formulacija:	Močivo prašivo (WP).
Opis pripravka:	Ridomil Gold Plus 42,5 WP je kombinirani fungicid sa sistemčnim i površinskim djelovanjem . Uz sistemčnu komponentu metalaksil-M sadži bakreni oksiklorid sa površinskim djelovanjem na široki spektar bolesti.
Način djelovanja:	Djelatna tvar metalaksil-M odlikuje se iznimno dobrom pokretljivošću u biljnim provodnim snopovima (uglavnom pokretljivošću prema gore). Samim time prati rast biljke premještanjem u novoizrasle biljne organe. Rezidualno djelovanje je među najdužim u usporedbi s ostalim peronosporicidima. Također je poznato da posjeduje najduži period kurativnog djelovanja , iako se radi antirezistentne strategije, preporučuje primjena u preventivi. Bakar je jedna od najstarijih djelatnih tvari koje se koriste u zaštiti od gljivičnih bolesti i još uvijek je jedan od najčešće upotrebljivanih površinskih fungicida. Osim djelovanja na gljivične bolesti, bakar djeluje i na različite bakterijske bolesti.
Primjena:	Protiv plamenjače vinove loze (<i>Plasmopara viticola</i>) u koncentraciji 0,4% odnosno 400 g u 100 l vode na 1000 m ² . Kod osjetljivih sorti s primjenom treba započeti nakon cvatnje kako bi se izbjegao negativan utjecaj fungicida na oplodnju.
Miješanje:	Ne preporučuje se miješanje sa sredstvima na bazi aluminijevog fosetila i folijarnim gnojivima.
	Sredstvo se može koristiti najviše tri puta u vegetaciji

Upozorenja:	na vinovoj lozi, u razmacima od 10-14 dana. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
Karenca:	Karenca za vinovu lozu iznosi 35 dana.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/03-01/274.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	200 g, 1 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Ridomil gold plus 42,5WP_NG2

- [PDF](#) (495 KB)