



Score 250 EC je sistemski fungicid, koji djeluje preventivno i kurativno.

Sastav:	Difenkonazol (250g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	Score 250 EC je sistemski fungicid, koji djeluje preventivno i kurativno na razvoj gljivičnih bolesti. Spada u skupinu triazolnih fungicida.
Način djelovanja:	Djelatna tvar difenkonazol preko zelenih dijelova (listovi, peteljke i izboji) brzo ulazi u biljku nakon čega kiša više ne može isprati fungicid. Kurativno djelovanje na pjegavost lista i krastavost ploda jabuke je maksimalno 96 sati kod srednje temperature 10°C. Kod viših temperatura taj je period nešto kraći. Preventivno djelovanje na istu bolest je maksimalno 3 dana. Kao i svi pripadnici triazolne skupine i difenkonazol ometa sintezu sterola u stanicama uzročnika bolesti. U jabuci za suzbijanje: pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (<i>Venturia inaequalis</i>) i to: - preventivno u koncentraciji 0,013%, odnosno 13 ml u 100 l vode. Prskanja se izvode počevši od stadija C-C3 pa do stadija I-J. Na početku prskamo u razmacima 7-10 dana, a kasnije 12-18 dana. - kurativno u koncentraciji 0,015%, odnosno 15 ml u 100 l vode. Prskanje se izvodi u roku maksimalno 96 sati od momenta stvaranja uvjeta za infekciju. Daljnja prskanja izvode se u razmacima 6-9 dana ili kada se stvore uvjeti za ponovne infekcije. - pepelnice jabuke (<i>Podosphaera leucotricha</i>) u

koncentraciji 0,013%, odnosno 1,3 ml na 10 l vode.

Male kulture i male namjene

1) Kupusnjače (kupus, kelj pupčar, kelj) za suzbijanje koncentrične pjegavosti (*Alternaria* spp.), suhe truleži (*Leptosphaeria macularis*) i bijele pjegavosti (*Pseudocercospora capsellae*) u dozi 0,3-0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena četiri puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 15 dana. Preporučeni utrošak vode je 100-500 l/ha. Sredstvo primjeniti preventivno ili pojavom prvih simptoma, odnosno tretiranje započeti u fazi 5-7 listova.

2) Mrkva za suzbijanje pepelnice (*Erisiphe heraclei*) i paleži lišća (*Alternaria dauci*) u dozi 0,3-0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena tri puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 12-18 dana. Preporučeni utrošak vode je 100-500 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma.

3) Celer (list i korjen) za suzbijanje sive pjegavosti lista (*Septoria apiicola*) u dozi 0,3-0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena četiri puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 14 dana. Preporučeni utrošak vode je 100-500 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma.

4) Peršin za suzbijanje paleži lista (*Alternaria* spp.) i sive pjegavosti (*Septoria* spp.) u dozi 0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena četiri puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 1000 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma.

5) Luk, poriluk, češnjak, luk kozjak/ljutika, luk vlasac za suzbijanje obične pjegavosti lista (*Cladosporium allii*) i hrđa (*Puccinia* spp.) u dozi 0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena četiri puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 1000 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma.

6) Salata za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (*Microdochium panattonianum*) u dozi 0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena četiri puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 1000 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma.

7) Malina za suzbijanje lisne hrđe (*Phragmidium rubiidea*) u dozi 0,4 l/ha. Dozvoljena je primjena tri puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 5-14 dana. Preporučeni utrošak vode je 1000 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma, u periodu prije

Primjena:

cvatnje i nakon berbe.

8) Jagoda za suzbijanje pepelnice (*Sphaerotheca aphans*) u dozi 0,5 l/ha. Dozvoljena je primjena tri puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 1000 l/ha. Sredstvo primjeniti pri pojavi simptoma.

KARENCA: Za kupusnjače (kupus, kelj pupčar, kelj), peršin, salatu i jagodu iznosi 21 dan, za mrkvu, celer, luk, poriluk, češnjak, luk kozjak/ljutika i luk vlasac iznosi 14 dana. Za maline je osigurana vremenom primjene.

OGRANIČENJA: Spo-Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i štitnika za lice kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom.

Spo- Obavezno nošenje zaštitne odjeće i zaštitnih rukavica kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom ili škropivom i u dodiru s površinama onečišćenim nerazrijeđenim sredstvom ili škropivom.

Miješanje:	Sredstvo se može miješati s većinom fungicida i insekticida.
Upozorenja:	Smije se primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu u razmacima od 7-10 dana.
Karenca:	35 dana za jabuke i ispašu.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/06-01/241.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	100 ml, 1l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Score 250 EC

- [PDF](#) (611 KB)