



Switch 62,5 WG je botriticid koji ostvaruje sistemsko, translaminarno i kontaktno djelovanje, a kombinacija dviju djelatnih tvari osigurava vrhunsko djelovanje na sivu plijesan.

Sastav:	Ciprodinil (375 g/l) + fludioksinil (250 g/l).
Formulacija:	Močive granule (WG).
Opis pripravka:	Switch 62,5 WG je kombinirani fungicid dviju djelatnih tvari; ciprodinil i fludioksonil koje se razlikuju po načinu djelovanja tako da je umanjena i mogućnost pojave rezistencije . Ova kombinacija omogućava postizanje translaminarnog i površinskog djelovanja.
Način djelovanja:	Zahvaljujući kombinaciji dviju djelatnih tvari pripravak Switch djeluje na sve faze u životnom ciklusu sive plijesni ; na klijanje spora, formiranje klične cijevi i penetraciju biljne kutikule te na rast micelija. Ciprodinil je sistemsko i translaminarna komponenta koja ulazi u biljno tkivo i sprečava penetraciju nakon klijanja spora te rast micelija unutar biljnog tkiva. Fludioksonil ostvaruje površinsko djelovanje, ne ulazi u biljku dublje od voštanih slojeva za koje se dobro veže što je bitno za otpornost na ispiranje. Fludioksonil djeluje na klijanje spora. Kombinacija ove dvije djelatne tvari također sprečava pojavu rezistencije sive plijesni na pripravak Switch 62,5 WG.
	Na vinovoj lozi za suzbijanje sive plijesni (<i>Botrytis cinerea</i>), u koncentraciji 0,08% (80 g u 100 l vode), uz utrošak škropiva od 1000 l/ha. Prvi puta se primjenjuje u vrijeme cvatnje, a drugi puta kada dolazi do promjene boje i mekšanja bobica. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje u istom nasadu. Na jagodama za suzbijanje sive plijesni (<i>Botrytis cinerea</i>) u količini od 1 kg/ha uz utrošak od najmanje 2000 l vode/ha. Smije se primijeniti najviše 3 puta u

vegetaciji.

Na **marelici** za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (*Monilia spp.*) u količini od 60 g/100 l vode. Dozvoljene 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku 10-14 dana;

Na **trešnji** za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (*Monilia spp.*) u količini 80-100 g/100 l vode.

Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.

Na **šljivi** za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (*Monilia spp.*) u količini od 80-100 g /100 l vode.

Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.

Na **breskvi i nektarini** za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (*Monilia spp.*) za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (*Monilia spp.*) u količini od 80-100 g /100 l vode. Dozvoljene 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha;

Na **kruški** za suzbijanje smeđe pjegavosti kruške (*Stemphylium versicarium*) u količini od 80-100 g/100 l vode. Dozvoljene 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha;

Na **rajčici i paprici** za suzbijanje sive truleži (*Botrytis cinerea*) i bijeli trulež (*Sclerotinia spp.*) u količini od 60-100 g/100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha;

Male kulture i male namjene

1) Američka borovnica za suzbijanje truleži bobica (*Monilinia vaccinicorymbosi*) u dozi 1,0 kg/ha. Dozvoljena je primjena tri puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 10 dana. Sredstvo primjeniti u vrijeme cvatnje.

2) Tikvice i patlidžan za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i sive plijesni (*Botrytis cinerea*) u dozi 0,8 kg/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 800 l/ha. Sredstvo primjeniti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

Primjena:

3) Grah za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i sive plijesni (*Botrytis cinerea*) u dozi 0,5-0,8 kg/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 800 l/ha. Sredstvo primjeniti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

4) Salata za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*) i sive plijesni (*Botryotinia cinerea*) u dozi 0,5-0,8 kg/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

5) Luk za suzbijanje sive plijesni (*Botryotinia cinerea*) u dozi 1,0 kg/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti prvi puta u fazi 2 lista, a drugi puta 3 tjedna kasnije.

6) Maline i kupine za suzbijanje sive plijesni (*Botryotinia cinerea*) u dozi 1,0-1,2 kg/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 800 l/ha. Sredstvo primjeniti poslije cvatnje.

7) Namjenski travnjaci (sportski tereni) za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis cinerea*), *Microdochium nivale*, *Typhula incarnata* u dozi 1,5 kg/ha. Sredstvo primjeniti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

8) Ukrasno bilje za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis cinerea*) u dozi 1,0 kg/ha. Sredstvo primjeniti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

KARENCA: Za američku borovnicu iznosi 21 dan, za grah, salatu, luk, maline i kupine iznosi 14 dana, za tikvice i patlidžan iznosi 7 dana.

OGRANIČENJA: Zabranjen pristup životinjama na tretiranu površinu neposredno nakon primjene.

Miješanje:	Sredstvo se može miješati sa većinom drugih pripravaka.
Upozorenja:	Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene treba spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskanog zaštitnog pojasa širine najmanje 20 m.
Karenca:	21 dan za vinovu lozu, 7 dana za jagode. 3 dana za papriku i rajčicu. 7 dana za marelice,

	trešnje, šljive, breskve i nektarine. 14 dana za kruške.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/06-01/148.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	80 g, 1 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Switch 62,5 WG

- [PDE](#) (597 KB)