



Topas 100 EC je sistemski fungicid iz skupine triazola s naglašenom aktivnošću na pepelnice u voćarstvu i vinogradarstvu.

Sastav:	Penkonazol (100 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	Topas 100 EC je sistemski fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na pepelnice u voćarstvu i vinogradarstvu.
Način djelovanja:	Djelatna tvar penkonazol brzo prodire kroz biljnu kutikulu te se unutar biljke sistemski kreće provodnim snopovima. Zbog toga je ova djelatna tvar zaštićena od ispiranja već nekoliko sati nakon aplikacije. Penkonazol ostvaruje preventivno i kurativno djelovanje. Osobito se ističe odličnim djelovanjem na pepelnice.
	Pepelnica vinove loze (<i>Uncinula necator</i>) u koncentraciji od 0,025% (25 ml u 100 l vode), uz utrošak škropiva od 1000 l/ha i razmak između tretiranja od 10 -12 dana. Sredstvo treba koristiti u vrijeme najjačeg pritiska bolesti tj. neposredno prije i neposredno poslije cvatnje vinove loze. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti preporučuje se miješanje sa pripravkom na osnovi sumpora Thiovit Jet. Pepelnica jabuke (<i>Podosphaera leucotricha</i>) u koncentraciji od 0,025% uz utrošak 1000 l vode/ha. Razmak između prskanja iznosi 10-12 dana. Kako navedena koncentracija zadovoljava suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuke (<i>Venturia inaequalis</i>) samo kod slabijih napada krastavosti, sredstvo je potrebno kombinirati s nekim od protektivnih fungicida za suzbijanje krastavosti.

Male kulture i male namjene

Primjena:

1) Lubenica za suzbijanje pepelnice (*Oidium spp.*) u koncentraciji 0,03 – 0,04 %. Primijeniti prskanjem u prvoj fazi bolesti. Tretiranje je potrebno provoditi ujutro ili navečer, zbog zaštite pčela.

2) Dinja i buča za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe orontii*, *Sphaerotheca fusca*) u dozi od 250-500 ml/ha. Dozvoljena je primjena dva do četiri puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku 14 – 16 dana. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolest. Tretiranje je potrebno provoditi ujutro ili navečer, zbog zaštite pčela. Folijarno prskati u zaštićenom prostoru i na otvorenom.

KARENCA: Za lubenicu iznosi 3 dana, za dinje i buče iznosi 21 dan na otvorenom i 3 dana, u zaštićenom prostoru.

OGRANIČENJA: Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i / ili popratnog lista.

Miješanje:

Sredstvo se može miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja u navedenim kulturama.

Upozorenja:

Sredstvo se smije primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Prilikom primjene valja spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Karenca:

21 dan za jabuku i 35 dana za vinovu lozu.

Podaci o registraciji:

UP/I-320-20/06-01/240.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list.

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

100 ml, 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Topas 100 EC

- [PDF](#) (603 KB)