



Zaštita breskve, nektarine i marelice

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
u proljeće	GLYPHOGAN + GALIGAN 240 EC	1% + 0,3 – 0,4 l/ha u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U mirovanju vegetacije – kasna jesen do rano proljeće	PENDIGAN 330 EC	4 – 6 l/ha između redova nasada	Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
Prije ili nakon nicanja korova	RACER 25 EC **	1 – 3 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ** ILI LEOPARD 5 EC **	0,5 – 2 l/ha 0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20 30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Prije i nakon cvatnje	MERPAN 80 WDG **	0,2 % 2 kg/ha	Šupljikavost lista koštičavih voćaka, krastavost breskve Narančasta pjegavost šljive
INSEKTICIDI			
Nakon cvatnje	KOHINOR 200 SL	0,025 %	Lisne uši – Breskvina zelena uš
Opadanje latica		0,75 l/ha	Tripsi**
OSTALO			
Zimsko prskanje u vegetaciji	NU-FILM-17 **	1 l/ha 0,5 l/ha	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU