



FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
u proljeće	GLYPHOGAN + GALIGAN 240 EC	1% + 0,3 – 0,4 l/ha u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
ljeti ili u jesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U mirovanju vegetacije – kasna jesen do rano proljeće	PENDIGAN 330 EC **	4 – 6 l/ha između redova nasada	Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
Prije ili nakon nicanja korova	RACER 25 EC **	1 – 3 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta do početka cvatnje korova	TOMIGAN 250 EC	1,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC **	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20 30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Prije cvatnje – od faze ružičastog pupa Kasniji stadiji vegetacije – nakon cvatnje Završetak cvatnje	MERPAN 80 WDG **	0,2 % 2 – 3 kg/ha	Krastavost
INSEKTICIDI			
Mine veličine 1-2 mm Lipanj, kolovoz (do početka cvatnje)	KOHINOR 200 SL**	0,0375 – 0,05 % 0,025 %	Miner okruglih mina Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škopivima

* Dovolja za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU