

 Zaštita jagode	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Od sredine rujna do ožujka u razvijenom nasadu, nakon zamatiranja cvjetnih pupova do početka cvatnje, u tek posađenom nasadu u jesen ili rano proljeće odmah nakon sadnje	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
	U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ** ILI LEOPARD 5 EC **	0,5 – 2 l/ha 0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	Početak cvatnje Slijedeća prskanja svakih 7-10 dana	MERPAN 80 WDG **	3,4 kh/ha – prvo 1,7 kg/ha – iduća	Siva plijesan
	U cvatnji u razmacima svakih 5-7 dana	FOLPAN 80 WDG **	2 kg/ha	Siva plijesan
	Od pojave simptoma bolesti do početka cvatnje	NIMROD 25 EC **	1,4 l/ha	pepelnica
	INSEKTICIDI			
	Nakon pojave	PYRINEX 48 EC **	1 – 2 l/ha 0,2% – prskati 285-570 ml škropiva/ biljci i okolnom tlu	Lisne uši, savijač, crveni pauk Jagodina pipa
	Prije cvatnje	APOLLO 50 SC **	0,4 l/ha	Crveni pauk (koprivina grinja), jagodina grinja
	OSTALO			
		NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU