

**Zaštita
krastavca**

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Nakon nicanja, krastavac u fazi 3 lista	AGIL 100 ** EC ILI LEOPARD 5 EC **	0,8 l/ha 0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Kod pojave prvih simptoma, u razmacima 7-14 dana	NIMROD 25 EC	0,04 – 0,005%	Pepelnica krastavaca
INSEKTICIDI			
Prije presađivanja	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom 0,4 l / 1000 dm	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
Kod pojave prvih mladih razvojnih pokretnih oblika, 2 puta u razmacima min. 14 dana	APOLLO 50 SC	0,04 %	Koprivin crveni pauk na salatnom krastavcu
U vegetaciji kod pojave štetnika	KOHINOR 200 SL **	0,075 %	Štitasti moljac
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU