



Hussar OD

Hussar je herbicid za primjenu u žitaricama sa najširim spektrom djelovanja na uskolisne i širokolisne korove. Odlično suzbija korove u ranim i kasnim razvojnim fazama žitarica. Sadrži zaštitnu tvar (safener) koja omogućuje visoku selektivnost za žitarice u suzbijanju najtvrdokornijih korova.

Sastav Jodosulfuron, 100 g/l,

Formulacija uljna disperzija (OD)



Uporaba

Hussar OD je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih i uskolistnih korova te nekih vrsta višegodišnjih širokolistnih korova u ozimoj i jarom pšenici, u ozimom i jarom ječmu, raži i pšenoraži u dozi 0,1 l/ha (10 ml/1000 m²). Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000m²). Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i pšenoraži (BBCH 13 do 37), te od trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13 do 29) u jarom pšenici i jarom ječmu. Najbolji rezultati postižu se kada su uskolisti korovi u fazi dva do četiri lista, a širokolistni u fazi dva do šest listova.

Hussar OD suzbia:

- uskoliste korove: bijelu rosuliju (*Agrostis gigantea*), običnu slakoperku (*Apera spica venti*), ljljeve (*Lolium spp.*), svjetlice (*Phalaris spp.*), jednogodišnju vlasnjaču (*Poa annua*), običnu vlasnjaču (*Poa trivialis*).
- širokolistne korove: gorcovijet (*Adonis spp.*) obični ščir (*Amaranthus retroflexus*), poljsku kriku (*Anagallis arvensis*), pravu kamilicu (*Anthemis spp.*), lobode (*Atriplex spp.*), zrakastu smrdulju (*Bifora radians*), rusomaču (*Capsella bursa pastoris*), različak (*Centaurea cyanus*), bijelu lobodu (*Chenopodium album*), ivančice (*Chrysanthemum spp.*), poljski osjak (*Cirsium arvense*), smrdelje (*Galeopsis spp.*), konicu (*Galinsoga ciliata*), prljepaću (*Galium aparine*), samonikli suncokret (*Helianthus annuus*), mrtve koprive (*Lamium spp.*), korovni sljez (*Malva spp.*), kamilice (*Matricaria spp.*), lucemu (*Medicago spp.*), potočnicu (*Myosotis arvensis*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), dvornike (*Polygonum spp.*), poljski žabnjak (*Ranunculus arvensis*), divlju rotkvu (*Raphanus raphanistrum*), kiselice (*Rumex spp.*), obični kostrš (*Sencio vulgaris*), poljsku gorušicu (*Sinapis arvensis*), svinjke (*Sonchus spp.*), poljska koljenica (*Spergula arvensis*), mišjakinju (*Stellaria media*), djeteline (*Trifolium spp.*), grahorice (*Vicia spp.*), ljubice (*Viola spp.*)

Priprema sredstva za uporabu

Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti. Čistom vodom napuniti spremnik prskalice sa 1/2; potrebne količine vode. Uljući miješanje. Ulići u prskalicu potrebnu količinu sredstva. Dopuniti spremnik prskalice s preostalom količinom vode. Miješanje mora biti mogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene.

Ograničenje

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u oštećenim usjevima koji su oslabljeni od biljnih bolesti, štetnika, mraza ili stajaće vode, može uzrokovati fitotoksičnost. Prijekom uporabe sredstva na sorti ječma toscana može doći do fitotoksičnosti. Kod primjene treba sprječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljeno korištenje ovog sredstva ili herbicidnih sredstava s istim mehanizmom djelovanja, može dovesti do selekcije otpornih vrsta korova. U cilju sprječavanja ili usporavanja pojavljivanja biotipova otpornih korova, preporučuje se izmjenjivanje sredstava koja imaju različit mehanizam djelovanja.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo HUSSAR OD ne smije se koristiti na kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode-mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Aviotretiranje

Nije dozvoljeno!

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva za zaštitu bilja HUSSAR OD s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Plodored

U slučaju prijevremenog propadanja usjeva moguće je sijati jaru pšenici ili jari ječam 15 dana nakon tretiranja. Kukuruz se može sijati 30 dana nakon tretiranja i obaveznoj oranji. Ulijana repica, šećerna repa, špinat, rajčica i suncokret mogu se sijati tek nakon godinu dana.

Karenca

Osigurana je vremenom primjene (OVP) u ozimoj i jarom pšenici, u ozimom i jarom ječmu, raži i pšenoraži.

Način čišćenja uređaja za primjenu

Ostatke škropiva razrijeđene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu sa uključenom mješalicom. Odmah nakon primjene potpuno isprazniti opremu za prskanje. Dobro isprati spremnik, cijevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukoniti sve vidljive naslage. Skinuti i očistiti mlaznice (dize) zaslone i filtere. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Prskalicu i mlaznice

(dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u pitku, tekući ili stajaću vodu i gdje nema opasnosti po domaće životinje.

Mjere zaštite pri radu

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušti. Sprječiti udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtarsku polumasku ili masku s plinskim filterom za organske plinove/pare. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, uz zaštitnu odjeću, obuću, rukavice, naočale koje dobro prijanaju ili vizir za zaštitu očiju, upotrijebiti i gumenu pregaču. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti sva korištena zaštitna sredstva.

Skladištenje

Sredstvo se mora uskladištitи i čuvati u originalno zatvorenoj ambalaži s orginalnom etiketom, na hladnom i suhom prostoru na temperaturi od 0 do 30 °C, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Datoteke za download

 [Sigurnosno-tehnički list](#) [377 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.