




Sekator OD

Sekator OD je sinonim za uspješnost, jednostavnost i ekonomičnost. Sekator OD je herbicid iz skupine sulfo nil urea koji suzbija široki spektar širokolisnih i nekih uskolisnih korova u žitaricama.

Sastav amidosulfuron (100 g/L), jodosulfuron metil (25 g/L),

Formulacija uljna disperzija (OD)



Uporaba

Sekator OD je selektivni kombinirani herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih korova (*Apera spica venti* - slakoperka) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: *Amaranthus retroflexus* - štir, *Ambrosia elatior* - ambrozija, *Anagalis arvensis* - vidovčica, *Anthemis* spp. - jameni, *Atriplex* spp., *Capsella bursa pastoris* - obična rusomača, *Chenopodium album* - loboda, *Cirsium arvense* - osjak, *Galinsoga* spp. - konica, *Galium aparine* - priljepača, *Lamium purpureum* - mrtva koprija, *Matricaria chamomilla* - kamilica, *Myosotis arvensis*, *Papaver rhoeas* - divlji mak, *Polygonum* spp. - dvornici, *Sinapis arvensis* - gorušica, *Stellaria media* - mišjakinja, *Sonchus arvensis* - gorčika, *Veronica hederifolia* - čestoslavica, *Veronica persica* - perzijska čestoslavica, *Viola* spp. - ljubičica, samonikla uljana repica u ozimoj pšenici i ozimom ječmu tretiranjem od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (fenofaze 21-32 prema BBCH skali) i u jaroj pšenici i jaroj ječmu tretiranjem od fenofaze 3 lista do završetka busanja (fenofaze 13-30 prema BBCH skali). Koristi se u količini od 100-150 mL preparata/ha (10-15 mL preparata na 1000 m²). Najbolji rezultati suzbijanja korova postižu se kada se obična slakoperka (*Apera spica venti*) nalazi u ranim fazama rasta i kada poljski osjak (*Cirsium arvense*) ima 10-15 cm visine, a poljska ljubica (*Viola* spp.) 2-4 lista. Kiša ne smije pasti 2 sata nakon primjene.

Priprema sredstva za uporabu

Potrebnu količinu Sekator-a OD otopite u posudi s vodom (cca 10 l), prije ulijevanja u spremnik prskalice. Dobivenu jednoličnu suspenziju ulijevajte u spremnik prskalice do pola napunjen vodom i u kojem je uključena mješalica. Dopunite spremnik preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastavite miješati u toku prskanja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljenu suspenziju utrošite istog dana. Prskati treba po mirnom vremenu, kad nema vjetrova, kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na obližnje usjeve.

Ograničenja

Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve. Sekator OD se može koristiti samo jednom u godini na istoj površini.

Ne koristiti preparat u blizini nasada na lakim tlima i na erozivnim tlima (rubne zone). Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperatura, oštećenih usjeva).

U slučaju preoravanja, nakon 15 dana mogu se sijati jara pšenica i jara ječam, a kukuruz nakon 30 dana i obveznog oranja. Uljana repica može se sijati nakon 4 mjeseca; šećerna repa, lucerna, špinat i suncokret nakon godinu dana. Ne koristiti Sekator OD u postnom žitu.

Fitotoksičnost

Uporaba na opisan način i u preporučenim dozama ne izaziva fitotoksične pojave.

Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve. Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperatura, oštećenih usjeva).

Zaštita okoliša

Sredstvo se ne smije koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje vode i na površinama s ekscisivnom erozijom. Prilikom primjene spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno.

Ostatke škropiva ne ispuštati u kanale i kanalizaciju.

Aviotretiranje

Nije dozvoljeno.

Miješanje

Ne preporuča se miješanje s fosforno-organskim i karbamatnim insekticidima i fungicidima koji sadrže karbendazim.

Karenca

Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.

Skladištenje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na hladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Datoteke za download



Sigurnosno-tehnički list [388 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.