



Aliette flash

Aliette® flash upotrebljavamo za suzbijanje plamenjače krastavaca, plamenjače salate, plamenjače hmelja i erwinije. Bakterijska palež jezgričavih voćaka u prošlosti je na našim područjima već prouzrokovala štetu, zato na zaraženim i ugroženim područjima preporučujemo preventivno tretiranje.



Sastav fosetil-AI (80 %)

Formulacija močive samodispergirajuće granule (WG)

Uporaba

Aliette® flash suzbija:

- **plamenjaču krastavaca, dinja, lubenica i bundeva** (*Pseudoperonospora cubensis*) u koncentraciji od 0,25-0,37 % (250-370 g u 100 l vode) ili u količini od 2,5-3,7 kg/ha (25-37 g u 10 l vode na 100 m²) u razmacima 7-10 dana;
- **plamenjaču salate** (*Bremia lactucae*) samo u proizvodnji salata glavatica (ostaci u lisnatim sortama su znatno viši) u koncentraciji od 0,25-0,37 % (250-370 g u 100 l vode) u razmacima 10-12 dana;
- **plamenjaču hmelja** (*Pseudoperonospora humuli*) u količini od 0,7-1,5 g sredstva po biljci za sprječavanje primarnih zaraza, ili u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode) za sprječavanje sekundarnih zaraza u razmacima od 14 dana.
- **bakterijsku palež jezgričavih vrsta voćaka** (*Erwinia amylovora*) primjenom u koncentraciji 0,25 % u vrijeme cvatnje i poslije cvatnje (vrijeme intenzivnog porasta mladica) svakih 5-7 dana. Aplikacija fungicida može se obaviti i nakon nevremena ukoliko je došlo do oštećenja biljnih organa. Fungicid se može koristiti i u kombinaciji s fungicidima na osnovi bakra. U tom slučaju Aliette flash primjeniti u koncentraciji 0,2 %, a fungicide na osnovi bakra u deset puta manjoj koncentraciji nego se uobičajeno koriste u vegetaciji.
- **gumozu** (*Phytophthora* spp.) na agrumima: u nasadima agruma u koncentraciji 0,25% (250g u 100 l vode), tretirati tripot: u travnju, srpnju i rujnu/listopadu (početkom, u sredini i kraju vegetacije); kod cijepljenja u koncentraciji 0,25%-0,30% (250-300 g u 100 l vode), 15 dana prije cijepljenja, tretiranje ponoviti nakon 3 ili 4 tjedna; u rasadnicima i mladim nasadima agruma u koncentraciji 0,30% (300 g u 100 l vode) ponavljajući tretiranje svaka 2 mjeseca; kod nasada agruma sa sustavom za navodnjavanje kapanjem primjeniti u količini 1-25 g/stablu, ovisno o krošnji, do najviše 10 kg/ha po primjeni, a najviše dvaput u vegetaciji
- **vlažnu trulež korjenova vrata** (*Phytophthora citrophthora*) na agrumima, u koncentraciji 0,25% (250 g u 100 l vode), primjenom u jesen, od početka promjene boje i tijekom sazrijevanja. U slučaju obilnijih kiša primijeniti u koncentraciji 0,30% (300 g u 100 l vode)
- **uzročnike bolesti iz roda Phytophthora na jagodama** u koncentraciji 0,25% (250 g u 100 l vode). Prvi puta primijeniti u mjesecu sadnje, a zatim svakih 25 dana.
- **uzročnike bolesti iz rodova Phythium i Phytophthora na travi** namijenjenoj za sportske terene i ukrasne travnjake u količini 12-24 kg/ha
- **uzročnike bolesti iz roda Phytophthora na čempresima**, primjenom u rasadnicima po tlu pomoću kante za zalijevanje u količini 10 g/m²
- **plamenjaču luka** (*Peronospora destructor*) na luku, u količini 2 kg/ha (0,2%) uz utrošak 1000 l vode/ha. Primijeniti 1-2 puta u vegetaciji kod prvih simptoma ili preventivno u razmacima od 10 dana. Sredstvo se može primijeniti od početka formiranja lukovice pa do veličine 75% konačnog promjera lukovice.

Širorenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

- **trulež korijena mandarine** (*Phytophthora* spp.) primijeniti folijarno u jesen od početka promjene boje plodova i tijekom dozrijevanja. Suzbija također i vlažnu trulež plodova.
- **peronosporu** (*Peronospora* spp.) **na ukrasnom bilju** primijeniti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Utrošak vode iznosi min 200 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Priprema sredstva za uporabu

Odmjerenu količinu Aliette® flash valja izmiješati s malo vode da se dobije fina kaša bez grudica, a zatim se kaša ulije u spremnik prskalice, koji je do pola ispunjen vodom i nakon toga dolije preostala količina vode. Neprestano se miješa dok se ne dobije jednolična suspenzija. PRIPRAVLJENO ŠKROPIVO TREBA ODMAH UTROŠITI.

Ograničenje

Aliette flash se u tijeku godine može rabiti najviše tri puta na krastavcima, dinjama, lubenicama, bundevama, salatima, a na hmelju šest puta u istom nasadu.

Fitotoksičnost

Ako se upotrijebi na prikladan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama, Aliette flash nije fitotoksičan za biljke.

Zaštita okoliša

Nije dopušteno prskanje Aliette-om flash u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Aviotretiranje

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Miješanje

Ne smije se miješati s folijarnim gnojivima, insekticidima na osnovi diklorvosa, bordoškom juhom i sredstvima lužnate reakcije i permanangatom. Također se ne smije miješati s folpetom, kaptanom i močivim sumporom u prisutnosti pripravka Titavin 2000 jer se javlja fitotoksičnost od Al+3 kationa. Ne smije se miješati sa uljnim pripravcima. U slučaju tretiranja s uljem, primijeniti sredstvo nakon tjedan dana. Na luku, agrumima, travnjacima, jagodama i čempresima ne smije se koristiti sa proizvodima koji sadrže bakar.

Karenca

Za krastavce traje 4 dana, 7 dana za jagode i luk, 14 dana za salatu glavaticu (u polju i zaštićenom prostoru), 15 dana za agrume, za dinje, lubenice, bundeve i jezgričavo voće 21 dana, a za hmelj 28 dana.

Iskustva s terena

Sve pripravke na osnovi Al-fosetila moramo najprije posebno otopiti u manjoj količini vode i tek ih zatim dodati škropivu. Tako ne može doći do taloženja škropiva.

Datoteke za download



[Proširenje registracije Aliette Flash](#) [123 kB]



[Sigurnosno-tehnički list](#) [358 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.