



Antracol Combi WP 76

Antracol Combi WP 76 kombinirani je fungicid, koji sadržava propineb i cimoksanil, zbog toga djeluje lokosistemično i kurativno. Prednost proizvoda Antracol Combi - je da štiti biljku 1 - 2 dana nakon što je došlo do uvjeta za razvoj bolesti.

Sastav propineb (70 %), cimoksanil (6 %)

Formulacija močivi prah (WP)

Uporaba

Antracol Combi WP 76 je kombinirani preparat od dvije djelatne tvari. Propineb djeluje preventivno, a cimoksanil sistemski i kurativno. Cimoksanil ulazi u biljku te ga kiša već nakon kratkog vremena nakon tretiranja ne može isprati.

Koristi se za suzbijanje slijedećih bolesti vinove loze:

- **plamenjače vinove loze** (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,25 % odnosno 2,5 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha,
- **crvene paleži vinove loze** (*Pseudopeziza tracheiphila*) u dozi 3-4 kg/ha u 1500-2000 l vode/ha (30-40 g u 15-20 l vode na 100 m² ili u koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 l vode) uz utrošak škropiva 1500-2000 l/ha.
- **crne pjegavosti vinove loze** (*Phomopsis viticola*) u koncentraciji 0,2 % odnosno 2 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha. Smanjuje napad uzročnika crne pjegavosti ako se tretiranja obave rano u proljeće u fenofazi 0-5 kada rožgu treba kvalitetno poprskati.

Koristi se za suzbijanje slijedećih bolesti krumpira:

- plamenjače krumpira (*Phytophthora infestans*) i koncentrične pjegavosti lišća (*Alternaria solani*) u dozi 2,5 kg/ha.

Priprema sredstva za uporabu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti rezervoar (spremnik) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenje

Smije se primijeniti najviše šest puta tijekom godine, s time da se nakon cvatnje može najviše četiri puta primijeniti. Razmaci između tretiranja iznose 10-12 dana.

Fitotoksičnost

Primijenjen u propisanim količinama i na opisani način Antracol Combi WP 76 nije fitotoksičan za vinovu lozu.

Zaštita okoliša

Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije baciti u kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.

Aviotretiranje

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena!

Miješanje

Sredstvo se ne smije miješati sa:

- diklorvosom, heptenofosom, fosfamidonom, dimetoatom;
- sumpornim sredstvima jer ta kombinacija usporuje razgradnju propineba i produžuje karencu na 56 dana.

Kod miješanja s koncentratima za emulziju treba izbjegavati one kombinacije kod kojih u škropivu dolazi do koagulacije. Suviše alkalna voda (pH iznad 7,5) ubrzava razgradnju cimoksanila.

Karenca

14 dana za krumpir, 21 dan za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Radna karenc

2 dana.

Skladištenje

Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.



Datoteke za download



Sigurnosno-tehnički list [422 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.