



Falcon EC 460

Falcon® EC 460 suzbija sve važnije bolesti žita i pepelnice vinove loze. Sadržava aktivnu tvar spiroksamin, koja je prvi otkriven predstavnik skupine spiroketalamina. Djeluje preventivno, kurativno i eradikativno (stop effect).

Sastav tebukanozol (167 g/L ± 10 g/L), spiroksamin (250 g/L ± 15 g/L), triadimenol (43 g/L ± 4,3 g/L)

Formulacija tekući koncentrat za emulziju (EC)



Uporaba

Falcon EC 460 je kombinirani sistemski fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti na:

a) pšenici i ječmu: pepelnice (*Erysiphe/Blumeria/graminis*), hrđa (*Puccinia* spp.), smeđe pjegavosti lista (*Septoria* spp.), smeđe pjegavosti pljevica (*Stagonospora nodorum*), sive pjegavosti lista ječma (*Rhynchosporium secalis f.spp. hordeum*), za suzbijanje mrežaste pjegavosti na ječmu (*Pyrenophora teres*), te smanjenje zaraze s paleži klasa (*Fusarium* spp.) u količini od 600 ml/ha uz utrošak vode od 300 l/ha. Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje (60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m²).

b) vinovoj lozi: pepelnice (*Uncinula necator*) u količini od 300-400 ml/ha (30-40 ml sredstva u 100 l vode na 1000 m²).

Priprema sredstva za uporabu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja

Sredstvo se može najviše dva puta koristiti u vegetaciji.

Fitotoksičnost

Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, Falcon® EC 460 nije fitotoksičan za navedene kulture.

Zaštita okoliša

Falcon® EC 460 se ne smije koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene spriječiti onečišćenje bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Miješanje

Ne preporuča se miješati sa sredstvima na osnovi: triazamata, karbamatnim insekticidima, malationom, fosalonom, metildationom, propargitom, heptenofosom, triklorfonom, diklorvosom, folpetom i kaptanom.

Karenca

42 dana za pšenicu, ječam i vinovu lozu.

Skladištenje

Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od -10 ni viša od 40 °C.

Iskustva s terena

Falcon bez problema možemo miješati s pripravcima za suzbijanje peronosporne vinove loze. Snažno se preporučuje njegova primjena u fazi najveće opasnosti zaraze pepelnicom. U žitu odlično suzbija kako bolesti lišća tako i bolesti klasa. To je pripravak, koji osim ostalih bolesti dobro suzbija i fuzarioze klasa. Ni u ratarstvu ne postoje nikakvi problemi kod miješanja s ostalim pripravcima (npr. Decis®).

Datoteke za download



Sigumosno-tehnički list [443 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.