



Infinito

Bayer je razvio novo rješenje protiv plamenjače krumpira, lisnatog povrća, kupusnjača i tikvenjača – pripravak Infinito®. Njegova su osnova dvije aktivne tvari: već priznata, propamokarb hidroklorid i posve nova, fluopikolid. Infinito time predstavlja najsuvremeniji pripravak za zaštitu od plamenjače. Neće vas razočarati ni u slučaju najjačeg pritiska bolesti ni kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Poznata su odlična iskustva iz Engleske i Nizozemske, gdje pripravak upotrebljavaju u praksi, te iskustva sa pokusa iz Hrvatske koja obećavaju, da će i hrvatski poljoprivrednici biti više nego zadovoljni.



Sastav fluopikolid (62,5 g/L), propamokarb (625 g/L)

Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)

Upotrebljuje se na

- krumpiru za preventivno suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) u kolicini 1,2-1,6 l/ha (u fazi usjeva BBCH 21-81), uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše četiri puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana.;

- krastavcima, tikvicama i bundevama (na otvorenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 1,2 -1,6 l/ha (u fazi usjeva BBCH 21-83) uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana;

- krastavcima i tikvicama (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 1,2 - 1,6 l/ha (u fazi usjeva BBCH: 21-83) uz utrošak škropiva 1000-1250 l/ha. Može se primjeniti najviše tri puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana;

- dinjama i lubenicama (na otvorenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 1,4 - 1,6 l/ha (u fazi usjeva BBCH: 21-86) uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana;

- dinjama i lubenicama (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 1,4 - 1,6 l/ha (u fazi usjeva BBCH: 21-86) uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše tri puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana;

- salati glavatici (na otvorenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Bremia lactucae*), primjenom nakon trećeg pravog lista (BBCH 13) u količini 1,4-1,6 l/ha uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše jedanput u vegetaciji;

- salati glavatici (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Bremia lactucae*), primjenom nakon trećeg pravog lista (BBCH 13-49) u količini 1,4-1,6 l/ha uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana;

- bijelom kupusu i crvenom kupusu (na otvorenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (*Peronospora* spp.) u količini 1,6 l/ha (u fenofazi usjeva BBCH 13-49) uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše tri puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana;

- cvjetači i brokoli za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 1,6 l/ha (u fenofazi BBCH 13-49) uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Može se primjeniti najviše tri puta u vegetaciji u razmacima od 7 do 12 dana.

- Primjene za male namjere:

1. na kelju pupčaru za suzbijanje plamenjače (*Peronospora* spp.) u količini 1,6 l/ha i u stadiju razvoja od trećeg razvijenog lista do formiranja glavica (BBCH 13-49). Sredstvo se smije primijeniti samo jednom godišnje,

2. na korabi za suzbijanje plamenjače (*Peronospora* spp.) u količini 1,6 l/ha i u stadiju razvoja od trećeg razvijenog lista do formiranja glavica (BBCH 13-49). Sredstvo se smije primijeniti samo jednom godišnje,

3. na luku za suzbijanje plamenjače (*Peronospora destructor*) u količini 1,6 l/ha u razmaku od 7 dana i stadiju razvoja od trećeg vidljivog lista do faze propadanja listova (BBCH 13-47). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje.

- Karenca:

14 dana za kelj pupčar i korabu, 7 dana za luk

OGRANIČENJA/MIJEŠANJE: Sredstvo se ne smije primjenjivati na područjima s puno oborina i pješčanim tlom. Da bi se ograničila opasnost razvijanja rezistentnosti patogena preporučuje se da se primjene sredstvom INFINITO obavljaju naizmjenično s fungicidima iz drugih kemijskih skupina sa drugačijim načinom djelovanja sukladno antirezistentnom programu. Ne smije se miješati s mankozebom i propinebom. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

KARENCA: 1 dan za krastavce u zaštićenom prostoru i tikvice u zaštićenom prostoru; 3 dana za krastavce na otvorenom prostoru, tikvice na otvorenom prostoru, bundeve na otvorenom prostoru, dinje na otvorenom i u zaštićenom prostoru te lubenice na otvorenom i u

zaštićenom prostoru; 7 dana za salatu glavaticu na otvorenom prostoru i krumpir; 14 dana za salatu glavaticu u zaštićenom prostoru, bijeli kupus na otvorenom prostoru, crveni kupus na otvorenom prostoru, cvjetaču i brokulu.

Datoteke za download

 [Vamostni list 2014](#) [77 kB]

 [Sigumosno-tehnički list](#) [366 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.