



Mythos

Mythos® je kontaktni i translaminami fungicid, koji se koristi za suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi.

Sastav pirimetanil (300 g/L)

Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)

Uporaba

Mythos® je kontaktni i translaminami fungicid u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SC). Primjenjuje se za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis cinerea*) na vinovoj lozi u količini od 2 - 2,5 L/ha (20 - 25 mL na 100 m²) ili u koncentraciji 0,2 - 0,25 % (200 - 250 mL na 100 L vode), uz utrošak škropiva od 1000 L/ha.

Proširenje uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Na ukrasnom bilju: za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis cinerea*) u dozi 2,5 l/ha. Vremenski razmak između primjena je 7-10 dana. Ne smije se miješati sa sredstvima na osnovi fosetil-Al.

Priprema sredstva za uporabu

Mythos® se dobro protrese u ambalaži, a zatim se u posebnoj, manjoj posudi napravi suspenzija (odmjerena količina Mythos®-a + otprilike ista količina vode), koja se zatim uz miješanje ulijeva u spremnik prskalice koji je napunjen s 2/3 ukupno potrebne količine vode. Nakon toga se (uz miješanje) u spremnik prskalice ulije preostala količina vode. Miješanje suspenzije je potrebno osigurati i za vrijeme prskanja, kako bi se spriječilo taloženje suspenzije u prskalici.

Ograničenje

Može se najviše 2 puta koristiti u vegetaciji.

Fitotoksičnost

Ako se primjeni na prikladan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama - Mythos® nije fitotoksičan.

Zaštita okoliša

Pri primjeni treba spriječiti onečišćenje vodotokova, zdenaca, jezera i mora radeći najmanje 20 m udaljeno.

Aviotretiranje

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Miješanje

Mythos® nije kompatibilan sa suspenzijama Wuxala. Ne preporuča se miješanje sa pripravcima na bazi aluminijevog fosetila. Sredstvo je kompatibilno s većinom općenito upotrebljivanih pesticida. Potencijalne mješavine treba najprije testirati na malim površinama.

Karenca

21 dana za vinovu lozu uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji. Nije primjenjivo na ukrasnom bilju.

Radna karenca

24 sata.

Skladištenje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Datoteke za download

 [Sigumosno-tehnički list](#) [396 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.