



## Previcur Energy

Previcur Energy je nadogradnja Previcura 607 SL. Sadržava propamokarb i fosefil-Al, dvije aktivne tvari, koje su komplementarne po načinu djelovanja. Previcur Energy odličan je fungicid za suzbijanje gljivičnih uzročnika bolesti na vrtnom raslinju, na otvorenom prostoru ili u staklenicima, a moguća je i aplikacija putem kapljičnog sustava za navodnjavanje.

**Sastav** propamokarb (632,4 g/L), fosefil (332,5 g/L)

**Formulacija** tekući koncentrat za otopinu (SL)



### Uporaba

- Previcur Energy je kombinirano kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje uzrokuju Phycomycetae sljedećih kultura:
- plamenjače krastavca (*Pseudoperonospora cubensis*) na krastavcima i tikvenjačama, u količini od 2 l/ha (200 mL na 1000 m<sup>2</sup>)
- plamenjače paprike (*Phytophthora capsici*), u količini od 2 l/ha (200 mL na 1000 m<sup>2</sup>): prva aplikacija nakon presađivanja, u koncentraciji 0,2 % i to zalijevanjem 2 L otopine na 1 m<sup>2</sup>, 7-10 dana nakon prve aplikacije primjeniti folijarno 2 l/ha (200 ml na 1000 m<sup>2</sup>), treća aplikacija prema potrebi folijarno u preporučenoj dozi od 2 l/ha (200 ml na 1000 m<sup>2</sup>).
- Pythium spp. u rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnika, gredice za sijanje) na **rajčici, patlidžanu, dinji, lubenici, krastavcima, tikvicama, zelenoj salati, potočarki (*Nasturtium officinalis*), matovilcu, endiviji, rukoli, cikoriji, radiču, lavljem zubu (*Leontodon autumnalis*), valerijani (*Valeriana officinalis*), cvjetići, kupusu, brokuli i duhanu** s jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m<sup>2</sup> prilikom sijanja ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 ml/m<sup>2</sup>, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m<sup>2</sup>, uz primjenu 2-4 l vode po m<sup>2</sup> po tretiranju;
- Pythium spp. u tlu putem sustava za navodnjavanje kap-po-kap ili lokaliziranim nanošenjem, **na rajčici, patlidžanu, dinji, lubenici, krastavcu i tikvicama**. Dozvoljena su dva tretiranja u količini 2-3 l/ha na 20000 l/ha vode. Prvi puta tretirati prilikom presađivanja, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna nakon prve primjene. Sredstvo pomješano s vodom nanjeti na vlažno tlo izbjegavajući prekomjerno natapanje. Sredstvo treba ostati lokalizirano u području oko korijena biljki. Preporuča se sredstvo primjeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja;
- plamenjače salate (*Bremia lactucae*) folijarnom primjenom na **zelenoj salati, potočarki (*Nasturtium officinalis*), matovilcu, endiviji, rukoli, cikoriji, radiču, lavljem zubu (*Leontodon autumnalis*), valerijani (*Valeriana officinalis*)** u količini 2-2,5 l/ha u razmacima od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 l/ha vode. Dozvoljena su dva tretiranja tijekom vegetacije.

### Priprema sredstva za uporabu

Odmjerenu količinu sredstva pomješamo s vodom da dobijemo gore navedenu koncentraciju. Ovo upotrebljavamo za potapanje, odnosno prskanje.

### Ograničenje

Folijama zaštita se smije najviše dva puta koristiti godišnje. Škropivo treba odmah utrošiti.

### Fitotoksičnost

Ako se primjeni na prikladan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama Previcur Energy nije fitotoksičan.

### Zaštita okoliša

Prilikom tretiranja treba spriječiti kontaminaciju mora, jezera, vodotoka, bunara i izvorišta vode tretiranjem najmanje 20 m udaljeno od njih. Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

### Aviotretiranje

Nije dozvoljeno.

### Miješanje

Mogućnost miješanja sa drugim sredstvima provjeriti prije uporabe.

### Karenca

3 dana za krastavce i slatke sorte paprike; 14 dana za tikvenjače; 21 dana za zelenu salatu, potočarku (*Nasturtium officinalis*), matovilac, endiviju, rukolu, cikoriju, radič, lavlji zub (*Leontodon autumnalis*), valerijanu (*Valeriana officinalis*); 21 dan za ljute sorte paprike; osigurana vremenom primjene u rajčici, patlidžanu, dinji, lubenici, cvjetići, brokuli, kupusu i duhanu (primjene na navedenim kulturama u rasadnicima i putem sustava za navodnjavanje kap-po-kap ili lokaliziranim nanošenjem).

### Skladištenje

Preparat uskladišti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

### Datoteke za download

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.

---