



Verita

Verita® je sistemski i kontaktni fungicid za suzbijanje gljivičnih oboljenja na vinovoj lozi. Štiti potpuno sve dijelove vinove loze (i jedva razvijene bobice, koje su još pokrivene cvjetnom kapicom). Već nakon 30 minuta biljka ga upije i najkasnije 2 sata nakon prskanja niti moguća jaka kiša ne može ga više isprati. Pripravak ne djeluje negativno na vrenje i kakvoću vina.

Sastav fosetil-Al (66,7 %), fenamidon (4,44 %)

Formulacija močive samodispergirajuće granule (WG)

Uporaba

Verita® je kombinirani fungicid za suzbijanje slijedećih biljnih bolesti u vinovoj lozi:

- plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,25 - 0,3 % (250 - 300 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l/ha vode. Može se koristiti 3 puta u razmacima od 14 dana od početka cvatnje.
- Ima sekundarno djelovanje na pepelnicu vinove loze (*Uncinula necator*).

Priprema sredstva za uporabu

Odmjerenu količinu Verite® valja izmiješati s malo vode da se dobije fina kaša bez grudica, a zatim se kaša ulije u spremnik prskalice, koji je do pola ispunjen vodom i nakon toga dolije preostala količina vode. Neprestano se miješa dok se ne dobije jednolična suspenzija. Pripravljeno škropivo treba odmah utrošiti.

Ograničenje

Sredstvo se smije primjeniti 3 puta u vegetaciji.

Fitotoksičnost

Ako se upotrijebi na prikladan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama, Verita® nije fitotoksična.

Zaštita okoliša

Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Pri primjeni treba spriječiti onečišćenje vodotokova, bunara, jezera i mora radeći na najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Miješanje

Verita® se ne smije miješati s bakrenim preparatima, folijarnim gnojivima i akaricidima na bazi amitraza. Verita je kompatibilna sa brojnim sredstvima za zaštitu bilja, ali prije miješanja s bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj pokusnoj površini.

Karenca

42 dana za vinovu lozu.

Skladištenje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na hladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Iskustva s terena

Veritu® je najbolje primijeniti prije cvatnje, odmah nakon preventivnog tretmana s Mikal® Flash-om. Smijemo ju upotrijebiti dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni. Idealno se uklapa u program zaštite sa drugim pripravcima na osnovi fosetil-Al kao što su Mikal® Flash, Profiler®, Mikal® Premium F. Da bi biljka uspostavila otpornost prema uzročniku plamenjače sredstva na osnovi fosetil-Al je potrebno koristiti minimalno 3 puta za redom. Veritu preporučamo koristiti u vrijeme velikog pritiska bolesti.



Datoteke za download

 [Sigumosno-tehnički list](#) [362 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.