



Zato Plus

Zato Plus je nadogradnja postojećeg pripravka Zato. Dodana mu je kontaktna komponenta, s namjerom da omogućiti optimalnu zaštitu od krastavosti i pepelnice na jabuci.

Sastav trifloksistrobin (4 %), kaptan (60 %)

Formulacija močive samodispergirajuće granule (WG)

Uporaba

Zato Plus je kombinirani fungicid koji se upotrebljava za suzbijanje bolesti na jabukama:

- uzročnika krastavosti plodova (*Venturia* spp.)
- pepelnice (*Podosphaera leucotricha*)

u količini od 1,25 - 1,5 kg/ha za 2 m visine krošnje. Za svaki dodatni jedan metar visine krošnje treba povećati dozu za 0,63 - 0,75 kg/ha.

Priprema sredstva za uporabu

Najprije je potrebno u posebnoj, manjoj posudi napraviti dobro izmiješanu suspenziju (odmjerena količina Zato Plus + otprilike ista količina vode), koja se zatim uz miješanje ulijeva u spremnik prskalice koji je napunjen s 2/3 ukupno potrebne količine vode. Nakon toga se uz miješanje u spremnik prskalice ulijeva preostala količina vode. Miješanje suspenzije je potrebno osigurati i za vrijeme prskanja, kako bi se spriječilo taloženje suspenzije u prskalicu.

Ograničenje

Na istom se nasadu smije primijeniti najviše 3 puta godišnje u razmacima 10 dana.

Fitotoksičnost

Ukoliko se primjenjuje u preporučenim količinama i na opisan način, sredstvo nije fitotoksično.

Zaštita okoliša

Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene treba spriječiti onečišćenje voda, mora, jezera, vodotoka i bunara ostavljanjem netretiranog zaštitnog pojasa širine najmanje 20 m. Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Aviotretiranje

Nije dozvoljeno.

Miješanje

Nije dozvoljeno miješanje sa kiselim insekticidima (diklorvos, endosulfanom, dimetoatom), uljnim preparatima, kalcij polisulfidom, bordoškom suspenzijom i lužnatim preparatima.

Karenca

21 dan za jabuke.

Radna zabrana

24 sata, a za rad 3 dana na povezivanju i obrezivanju 3 dana.

Skladištenje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.



Datoteke za download

 [Sigurnosno-tehnički list](#) [386 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.