

GRAH & GRAŠAK

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
NAKON SJETVE, A PRIJE NIKANJA	■ AFALON DISPERZIJA 1,35 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	jednogodišnje širokolisne korove te smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima	OVP
U FAZI RAZVOJA 1 - 3 TROLISKE KULTURE	■ PULSAR 40 EC 1,0 l/ha jednokratno ■ PULSAR 40 EC 1,2 l/ha u split aplikaciji (0,6+0,6 ili 0,7+0,5 ili 0,8+0,4 l/ha ovisno o poniku korova) ili	jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove	63 dana
	■ PULSAR 40 EC 0,8 l/ha + ■ BASAGRAN 480 1,0 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove	63 dana
U FAZI RAZVOJA 4. LISTA KULTURE (BBCH 14)	■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha jednokratno ili ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha u split aplikaciji (1+1 l/ha uz dodatak okvašivača kod svake primjene) .	jednogodišnje širokolisne korove	OVP
U FAZI ZELENE MAHUNE	■ AFALON DISPERZIJA 0,8 l/ha (dozvoljeno samo u grahu)	jednogodišnje širokolisne korove te smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima	OVP
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ CHROMOSUL 80 0,3 - 0,4% (30 - 40 g na 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ SIGNUM 1,0 kg/ha (dozvoljeno samo u grahu)	sivu plijesan, hrđu graha	21 dan
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ BOXER 200 SL 0,25 - 0,5 l/ha	graškovu zelenu uš, crnu bobovu uš	14 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana za grah, 14 dana za grašak
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša, sovice	
	■ FASTAC 10 EC 0,125 l/ha	prugaste pipe mahunarke	
	■ FASTAC 10 EC 0,1 l/ha	crnog graškovoog savijača	
U FAZI 95 PREMA BBCH SKALI (kada je grašak suh)	■ DIQUA 2 - 3 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	desikacija graška	10 dana
7 DANA PRIJE ŽETVE (kada je sadržaj vlage u zrnu manji od 30%)	■ HERKULES SUPER 3 - 4 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	predžetveno suzbijanje korova u grašku za kombajniranje	7 dana



NAPOMENA:

Sredstvo AFALON DISPERZIJA tretirati u grahu isključivo kada je u fazi zelene mahune.
Sredstvo Boxer 200 SL tretirati isključivo nakon cvatnje.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA

