

KUPUSNJAČE

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
ZAŠTITA U KLIJALIŠTU		
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA 	■ POLYRAM DF 0,20%	plamenjaču, bolesti polijeganja
PRIJE PRESADIVANJA (potapanjem kontejnera 15 min)	■ BOXER 200 SL 0,1% (100 ml na 100 l vode)	kupusnu muhu
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ PUŽOMOR 3-5 g/m ²	suzbija sve vrste puževa

ZAŠTITA U POLJU		
PRIJE PRESADIVANJA (10-14 dana)	■ OXALIS 4-6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove
PRIJE PRESADIVANJA (unijeti ravnomjerno u tlo)	■ DURSBAN G-7,5 50-60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15-20 kg/ha tretiranjem u redove ■ DURSBAN E-48 6-8 l/ha širom ili 2-3 l/ha u redove	štetnike u tlu
8 - 10 DANA NAKON PRESADIVANJA	■ BUTISAN S 2-2,5 l/ha	uskolisne i neke širokolisne korove
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 1 kg/ha	pjegavost i prstenastu pjegavost
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovica pozemljuša, sovica
	■ FASTAC 10 EC 0,075 l/ha ili ■ CHROMOREL D 0,6 l/ha	kupusnog buhača
	■ FASTAC 10 EC 0,1 l/ha ili ■ ALVERDE 1 l/ha	kupusnog moljca
	■ FASTAC 10 EC 0,1 l/ha ili ■ RELDAN 40 EC 1,25 l/ha ili ■ CHROMOREL D 0,5 l/ha ili ■ ALVERDE 1 l/ha	kupusnog bijelca, malog kupusara
	■ CHROMGOR 40 1 l/ha	kupusne muhe, lisne uši



NAPOMENA:

Sredstvo RELDAN 40 EC se smije primjenjivati u kupusnjačama najkasnije do 01.07.2014.
Sredstvo CHROMGOR 40 se smije primjenjivati u kupusnjačama najkasnije do 01.01.2015.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi



OVDJE ČUVAM JA

