



PAPRIKA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NIKANJA DO PRESADIVANJA RASADA	■ TREPAK 607 SL 0,25% (25 ml sredstva u 10 l vode) zalijevanjem rasada u količini 4 litre 0,25%-tne otopine na m ² ili zalijevanjem rasadih paprika sa 0,2 litre 0,25%-tne otopine po biljci. Ne smije se koristiti u proizvodnji ljutih papričica i ranih sorata paprika kratke vegetacije.	bolesti polijeganja rasada	35 dana
	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 - 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	
PRIJE PRESADIVANJA (10-14 dana)	■ OXALIS 4 - 6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove	OVP
PRIJE PRESADIVANJA ILI SJETVE	■ DURSBAN G-7,5 50 - 60 kg/ha primjenom po cijeloj površini ili 15 - 20 kg/ha primjenom u redove. ■ DURSBAN E-48 6 - 8 l/ha širom ili 2 - 3 l/ha u trake. Obavezno unošenje u tlo.	štetnike u tlu (žičnjake, grčice hrušta, rovice, sovice)	42 dana
	a.t. pendimetalin 4 - 5 l/ha	jednogodišnje travne i neke širokolisne korove	63 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ PUŽOMOR 3 - 5 g/m ²	sve vrste puževa	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO	■ CHROMOSUL 80 0,3 - 0,4% (30 - 40 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ STROBY WG 0,02 - 0,05% (20 - 50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 0,1 - 0,15% (10 - 15 g na 10 l vode)	pepelnicu, sivu plijesan	7 dana za sorte slatke paprike, 21 dan za ljute sorte paprike
	■ TREPAK 607 SL zalijevanjem sa 0,2 litre 0,25%-tne otopine po biljci. Ne smije se koristiti u proizvodnji ljutih papričica i ranih sorata paprika kratke vegetacije.	gangrena na paprici	35 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠETNIKA	■ LASER 0,03 - 0,05% uz dva tretiranja u razmaku 3 - 4 dana.	lisnog minera, kukuruznog moljca, kalifornijskog tripsa	7 dana
	■ ALVERDE 1 l/ha	južnoameričkog moljca rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), žutu kukuruznu sovicu, kukuruznog moljca, sovice	3 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovice, gusjenica sovice pozemljaša	7 dana



NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u paprici najkasnije do 01.07.2014.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi



OVDJE ČUVAM JA