

RAJČICA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 - 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	
PRIJE PRESADIVANJA (10-14 dana)	■ OXALIS 4 - 6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove	OVP
PRIJE PRESADIVANJA ILI SJETVE	■ DURSBAN G-7,5 50-60 kg/ha primjenom po cijeloj površini ili 15-20 kg/ha primjenom u redove. ■ DURSBAN E-48 6-8 l/ha širom ili 2-3 l/ha u trake. Obavezno unošenje u tlo.	štetnike u tlu (žičnjake, grčice hrušta, rovice, sovice)	42 dana
	a.t. pendimetalin 4-5 l/ha	jednogodišnje travne i neke širokolisne korove	49 dana
8 - 10 DANA NAKON PRESADIVANJA	■ TOR 70 WG 750 g/ha. Obavezno prskati pod list rajčice. Nije dozvoljena primjena u proizvodnji rajčice iz sjemena zbog fitotoksičnosti.	sjemenske jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove	42 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ PUŽOMOR 3-5 g/m ²	sve vrste puževa	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO	■ CUPRABLAU Z 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode)	plamenjaču i pjegavost lista	14 dana
	■ STAR 80 WP 2,0-2,5 kg/ha (20-25g na 100 m ²)	plamenjaču i crnu pjegavost	14 dana
	■ CHROMOSUL 80 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ POLYRAM DF 2,0 kg/ha (200 g sredstva u 60-80 l vode na 1.000 m ²)	plamenjaču	14 dana
	■ STROBY WG 0,02-0,05% (20-50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
	■ ELECTIS WG 1,5-1,8 kg/ha (150-180 g sredstva na 1.000 m ²)	plamenjaču i koncentričnu pjegavost	7 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 0,1-0,15% (10-15 g na 10 l vode)	pepelnicu, sivu plijesan, baršunastu plijesan	3 dana
	■ STROBY WG 0,02-0,05% (20-50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ LASER 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.	lisnog minera	3 dana
	■ TEPPEKI 500 WG 0,10-0,12 kg/ha	zelenu breskvinu uš i pamukovu lisnu uš	3 dana
	■ ALVERDE 1 l/ha	južnoameričkog moljca rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), žutu kukuruznu sovicu, sovice	3 dana
	■ BOXER 200 SL 0,1% (10 ml na 10 l vode).	odrasli stadij cvjetnog štitastog moljca	14 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovica, gusjenica sovica pozemljuša	7 dana
	■ CHROMOREL - D 0,6 l/ha	gusjenice sovica na listu i plodu, krumpirovu zlaticu	5 dana



NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u rajčici najkasnije do 01.07.2014.

Sredstvo TOR 70 WG se smije primjenjivati u rajčici najkasnije do 01.01.2015.

Sredstvo TEPPEKI 500 WG se još može primjenjivati u krastavcu, krastavcu za preradu-kornišon, tikvici, tikvi, dinji i lubenici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) u količini od 0,10 kg/ha.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi



OVDJE ČUVAM JA

