

ŠEĆERNA REPA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
PRIJE SJETVE	■ OXALIS 2-6 l/ha	uskolisne i širokolisne korove
OSNOVNO TRETIRANJE (nakon sjetve, a prije nicanja) 	■ PYRAMIN WG 4-5 kg/ha + zemljišni herbicid za uskolisne korove	jednogodišnje širokolisne korove + jednogodišnje uskolisne korove
	■ DIQUA 2 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove
U NICANJU REPE I KOROVA (kada je repa u fazi kotiledona) 	■ PYRAMIN WG 1 kg/ha	jednogodišnje širokolisne korove
KOREKTIVNO A: kada repa ima 1-2 para lista, 7-10 dana nakon prethodnog tretiranja ili KOREKTIVNO B: kada repa ima 2-3 para listova, a korovi 1-2 para listova 	■ PYRAMIN WG 1,5 kg/ha +	jednogodišnje širokolisne korove
	■ LOGO 300 0,2 l/ha	širokolisne korove
U VRIJEME POJAVE ŠTETNIKA 	■ CHROMOREL D 0,6 l/ha	gusjenice kupusara, repinog buhača
	■ CHROMGOR 40 0,75 - 1,0 l/ha	repinu muhu, lisne uši
	■ MAVRIK 2 F 0,2 l/ha	crnu repinu uš
U VRIJEME POJAVE PRVIH PJEGA NA LISTU 	■ DUETT ULTRA 0,4 - 0,6 l/ha iii ■ OPERA 0,75 - 1,0 l/ha	pjegavost lista (cerkosporu)



NAPOMENA:

Sredstvo CHROMGOR 40 se smije primjenjivati u šećernoj repi najkasnije do 01.01.2015.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA

